



QUALITÄTSBERICHT

2017

gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V



Hessenklinik
Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH
Enser Str. 19
34497 Korbach

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.0 am
21.01.2019 um 14:47 Uhr erstellt.
netfutura Deutschland GmbH: <https://www.netfutura.eu>
promato QBM: <https://qbm.promato.de>

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Einleitung..... | 5 |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses..... | 7 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses..... | 7 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers..... | 7 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus..... | 7 |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie..... | 7 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses..... | 8 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses..... | 11 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit..... | 15 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses..... | 16 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus..... | 16 |
| A-10 Gesamtfallzahlen..... | 16 |
| A-11 Personal des Krankenhauses..... | 16 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung..... | 21 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung..... | 28 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen..... | 29 |
| B-1.1 Innere Medizin..... | 29 |
| B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen..... | 29 |
| B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 29 |
| B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 32 |
| B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 32 |
| B-1.6 Diagnosen nach ICD..... | 32 |
| B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 46 |
| B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten..... | 60 |
| B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V..... | 62 |
| B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 62 |
| B-1.11 Personelle Ausstattung..... | 63 |
| B-2.1 Geriatrie..... | 65 |

| | |
|---|-----|
| B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 65 |
| B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 65 |
| B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 66 |
| B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 66 |
| B-2.6 Diagnosen nach ICD | 66 |
| B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 69 |
| B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 71 |
| B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 71 |
| B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 72 |
| B-2.11 Personelle Ausstattung | 72 |
| B-3.1 Allgemein- Viszeral- u.Gefäßchirurgie&Unfallchirurgie u. Orthopädie | 74 |
| B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 74 |
| B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 74 |
| B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 81 |
| B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 81 |
| B-3.6 Diagnosen nach ICD | 82 |
| B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 91 |
| B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 134 |
| B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 137 |
| B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 141 |
| B-3.11 Personelle Ausstattung | 141 |
| B-4.1 Frauenheilkunde und Geburtshilfe..... | 144 |
| B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 144 |
| B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 144 |
| B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 145 |
| B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 145 |
| B-4.6 Diagnosen nach ICD | 145 |
| B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 150 |
| B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 158 |
| B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 159 |

| | |
|---|-----|
| B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 159 |
| B-4.11 Personelle Ausstattung | 159 |
| B-5.1 Anästhesie und Intensivmedizin | 162 |
| B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 162 |
| B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 162 |
| B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 162 |
| B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 163 |
| B-5.6 Diagnosen nach ICD | 163 |
| B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 163 |
| B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 163 |
| B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V..... | 163 |
| B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 163 |
| B-5.11 Personelle Ausstattung | 163 |
| B-6.1 Urologie | 166 |
| B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 166 |
| B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 166 |
| B-6.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 167 |
| B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 167 |
| B-6.6 Diagnosen nach ICD | 167 |
| B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 168 |
| B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 171 |
| B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V..... | 171 |
| B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 171 |
| B-6.11 Personelle Ausstattung | 171 |
| B-7.1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde..... | 173 |
| B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 173 |
| B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 173 |
| B-7.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 174 |
| B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung..... | 174 |
| B-7.6 Diagnosen nach ICD | 174 |

| | |
|--|-----|
| B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS..... | 176 |
| B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 180 |
| B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 180 |
| B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft..... | 180 |
| B-7.11 Personelle Ausstattung | 180 |
| | |
| Teil C - Qualitätssicherung | 182 |
| C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V | 182 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V..... | 276 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V..... | 277 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 277 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V . | 277 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 277 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V | 277 |

Einleitung

Die Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH ist ein modernes und hochleistungsfähiges Krankenhaus der Akut- und Regelversorgung. Wir verfügen über die Fachabteilungen Innere Medizin, Geriatrie, Unfallchirurgie/Orthopädie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Anästhesie und operative Intensivmedizin, Geburtshilfe/Gynäkologie sowie die Belegabteilungen für Urologie und HNO. Als modernes Gesundheitszentrum behandeln wir jährlich ca. 11.000 stationäre und 17.000 ambulante Patientinnen und Patienten.

Wir sind Schwerverletztenkrankenhaus, zertifiziertes regionales Traumazentrum, Endoprothetikzentrum sowie zertifiziertes Akademisches Lehrkrankenhaus. Außerdem sind wir als Kooperationskrankenhaus des zertifizierten Brustzentrums Regio unter dem Dach der Universität Marburg auf die gezielte Erforschung, Behandlung, Versorgung und Nachsorge von Brusterkrankungen spezialisiert.

Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Göttingen bieten wir das Praktische Jahr (PJ) für Medizinstudenten an. Wir beteiligen wir uns mit viel Engagement an der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses.

Wir betreiben ein Medizinisches Versorgungszentrum mit den Fachrichtungen Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kardiologie sowie Onkologie und Hämatologie.

Im Krankenhaus befinden sich mit uns kooperierende Facharztpraxen für, Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Urologie und Radiologie. Eine augenärztliche Praxis führt bei uns im Rahmen eines Kooperationsvertrages ambulante Augenoperationen durch.

In einer zweiten großen Erweiterungsmaßnahme (2005 bis 2008) wurden hochmoderne Funktionsbereiche (OP, Röntgen, Endoskopie, Echokardiographie), drei neue Stationen mit großzügigen und freundlichen Patientenzimmern sowie eine gemütliche Cafeteria für Besucher, Patientinnen und Patienten geschaffen. Im Rahmen der dritten Erweiterungsmaßnahme sind im Laufe des Jahres 2016 noch drei weitere moderne Stationsbereiche sowie eine neue Intensivabteilung, eine Intermediate Care Einheit und eine Stroke Unit Einheit (Schlaganfall-Einheit) in Betrieb genommen worden. Als Teil der dritten Erweiterungsmaßnahme steht die Ausweitung der Geriatrie um zusätzliche 25 bis 30 Betten noch aus. In einer weiteren Baumaßnahme wird in den kommenden Jahren der OP-Teilbereich aus dem Jahre 1984 erweitert und komplett saniert.

Mit modernsten diagnostischen und therapeutischen Behandlungsverfahren, einer innovativen medizintechnischen Ausstattung der neusten Generation, professionellen Arbeiterteams sowie patientenorientierten Serviceleistungen kümmern wir uns in allen Belangen um das Wohl unserer Patienten. Über unser Leistungsspektrum wird die Bevölkerung regelmäßig im Rahmen von Publikationen, Vorträgen und Veranstaltungen informiert.

Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes CLINOTEL und verfolgen höchste Qualitätsansprüche, die weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Wir sind bestrebt, uns kontinuierlich zu verbessern und durch bestmögliche medizinische und pflegerische Maßnahmen die optimale Versorgung und Sicherheit unserer Patienten zu gewährleisten, denn die patientenorientierten Serviceleistungen haben für uns oberste Priorität. Zur Gewährleistung einer optimalen und umfassenden Patientenversorgung stehen wir in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten der Region.

Wir wissen aber auch, dass da, wo Menschen tätig sind, Fehler gemacht werden. Kritik sehen wir daher als Chance, uns zu verbessern und uns weiterzuentwickeln. Aus Fehlern wollen wir lernen. Durch anonyme Befragungen mittels Fragebögen versuchen wir daher, Unzulänglichkeiten auf die Spur zu kommen und die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten zu messen.

In dem vorliegenden Qualitätsbericht 2017 informieren wir über das Leistungsspektrum und Kennzahlen sowie Charakteristika der Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH. Hierbei sind Form und Umfang des Berichtes durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen weitestgehend vorgegeben.

Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Name | Christian Jostes |
| Position | Geschäftsführer |
| Telefon | 05631 / 569 - 101 |
| Fax | 05631 / 569 - 500 |
| E-Mail | info@krankenhaus-korbach.de |

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Name | Christian Jostes |
| Position | Geschäftsführer |
| Telefon. | 05631 / 569 - 101 |
| Fax | 05631 / 569 - 500 |
| E-Mail | info@krankenhaus-korbach.de |

Weiterführende Links

| | |
|--------------------------------------|---|
| URL zur Homepage | http://www.krankenhaus-korbach.de/ |
| URL für weitere Informationen | https://www.facebook.com/KrankenhausKorbach |

Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

I. Angaben zum Krankenhaus

| | |
|---------------------------------|---|
| Name: | Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH |
| Institutionskennzeichen: | 260620670 |
| Standortnummer: | 00 |
| Hausanschrift: | Enser Str. 19 34497 Korbach |
| Postanschrift: | Enser Str. 19 34497 Korbach |
| Internet | http://www.krankenhaus-korbach.de/ |

Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dr. med. Arved-Winfried Schneider | Chefarzt Medizinisches Klinik | 05631 / 569 - 156 | 05631 / 569 - 342 | innere@krankenhaus-korbach.de |

Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Gerlinde Stremme | Pflegedienstleitung | 05631 / 569 - 116 | 05631 / 569 - 500 | g.stremme@krankenhaus-korbach.de |

Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Christian Jostes | Geschäftsführung | 05631 / 569 - 101 | 05631 / 569 - 500 | info@krankenhaus-korbach.de |

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| | |
|--------------|---|
| Name: | Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH |
| Art: | öffentlich |

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus |
| Universität | Universität Göttingen |

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | In monatlich stattfindenden medizinischen Vorträgen informieren Ärzte die interessierte Öffentlichkeit über Prävention, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Erkrankungen. Vierteljährlich wird ein Gesprächskreis für Angehörige von Schlaganfallpatienten angeboten. |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | Es werden Atemtherapie bei Intensivpflegepatienten, Asthmatikern, Patienten mit Lungenentzündung, Rippenfraktur und krankheitsspezifische Präventionsprogramme angeboten. |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | Mehrere wöchentlich werden Kurse zum Babyschwimmen im krankenhauseigenen Bewegungsbad angeboten. |
| MP06 | Basale Stimulation | |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Hospizdienst im Hause, Abschiedsraum |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | Das Krankenhaus verfügt über ein eigenes Bewegungsbad. Hier werden u. a. Präventionskurse nach § 20 SGB V (z. B. Aquafit) sowie Wassergymnastik in Einzelanwendung angeboten. |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | Es werden Gesundheits- und Rehabilitationssport sowie Gerätetraining angeboten. |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | Die Bobath-Therapie wird in der Physiotherapie durchgeführt und ist ein integraler Bestandteil des Pflegekonzeptes. |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | Wird von speziell geschulten Diabetesberatern und Diätassistenten durchgeführt. |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | Der Chefarzt der Inneren Medizin besitzt die Zusatzqualifikation als Ernährungsmediziner. Die Diätassistentin des Krankenhauses führt erkrankungsspezifische Ernährungsberatungen durch. |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Im Rahmen des Entlassmanagement ist unter Einsatz zusätzlicher Personal- und Organisationsressourcen das Case Management - unser so genanntes KOMPASS® Team - etabliert (siehe Punkt MP 17). |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | Die im Rahmen der Geriatrie etablierte Ergotherapie steht den Patienten aller Abteilungen zur Verfügung. |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | Zur Optimierung der nachstationären Versorgung wird das Konzept des Case Managements umgesetzt. Durch zielgerichtete Koordination und frühzeitige Kommunikation aller Beteiligten werden Versorgungslücken vermieden sowie die Kontinuität und Qualität der Nachversorgung gesichert. |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | Werden im Rahmen der "Elternschule" von Hebammen angeboten. |
| MP21 | Kinästhetik | |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | Die Beratungsgruppe für Inkontinenz- und Stomatherapie berät Patienten und Angehörigen u. a. über Methoden und Hilfsmittel, die Betroffenen helfen, das Leben mit der Inkontinenz (Blasen- und Darmschwäche) zu erleichtern. |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | Es werden Lymphdrainage in der Traumatologie, Onkologie und dazugehörige Bandagierung und Kompression angeboten. |
| MP25 | Massage | Es werden klassische Massagetherapie sämtlicher Körperteile (Rücken, Arme, Beine, Ganzkörper), Schröpfkopfmassage, Bindegewebsmassage angeboten. |
| MP27 | Musiktherapie | |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | Es werden Elektrotherapie (Interferenz, Diadynamisch, Galvanisation, Iontophorese, Hochvolt), Ultraschall, Phonophorese, Lasertherapie und Inhalationstherapie angeboten. Diese Leistung wird unter der Leitung des Chefarztes der Chirurgie, der über die Qualifikation Sportmediziner verfügt, angeboten. |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Es werden Manuelle Therapie, Bobath-Therapie, Schlingentisch und Medizinische Trainingstherapie (MTT) angeboten. |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | Als lizenzierter Anbieter von Präventionskursen ist die Physiotherapie von allen Kostenträgern anerkannt. Es werden kontinuierlich verschiedene Kurse angeboten (z. B. Wassergymnastik, Rückenschule, Nordic Walking). Eine Informationsbroschüre kann beim Krankenhaus angefordert werden (oder Homepage). |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | Rückenschule wird in der Physiotherapie als Präventionskurs nach § 20 SGB V sowie als Individualtherapie angeboten. |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| MP36 | Säuglingspflegekurse | Säuglingspflegekurse werden im Rahmen der "Elternschule" (Informations- und Kursprogramm der Geburtshilfe) angeboten. |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | Die Akutschmerztherapie erfolgt nach einem interdisziplinären Schmerzkonzept. |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Am Krankenhaus etabliert sind Beratungsgruppen für Schlaganfall und Diabetes. Eine Informationsbroschüre kann beim Krankenhaus angefordert werden. Eine Diätassistentin führt erkrankungsspezifische Ernährungsberatungen durch. |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | Entspannungsmassage |
| MP41 | Spezielles Leistungsangebot von Entbindungspflegern und/oder Hebammen | Im Rahmen der "Elternschule" bietet die Geburtshilfe in Kooperation mit der Hebammenpraxis ein ganzheitliches Informations- und Beratungsangebot. Es umfasst Kursprogramme, Vorträge, Workshops rund um die Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | Die Phyto-Aroma-Pflege ist ein integraler Bestandteil des Pflegekonzeptes. |
| MP43 | Stillberatung | Hebammen und Pflegekräfte beraten Mütter umfassend zum Thema Stillen. Zum Erfahrungsaustausch für Mütter finden regelmäßige Treffen der Stillgruppe statt. Für Fragen und Probleme steht eine 24 h-Still-Hotline zur Verfügung. |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | Speziell ausgebildete Enterostoma-Therapeuten gewährleisten die pflegerische, therapeutische und psychosoziale Betreuung von Enterostoma-Trägern und ihren Angehörigen. |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Die individuelle Versorgung mit Hilfsmitteln und Orthopädietechnik ist durch die Kooperation mit niedergelassenen Orthopädietechnikern und zeitnahe Organisation (u. a. im Rahmen des Case-Managements) gewährleistet. |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | Wärmetherapie wird in Form von Fango, Heißluft und Mikrowellenbestrahlung in der Physiotherapie durchgeführt. Kältetherapie wird sowohl in der Physiotherapie als auch dezentral auf den Stationen durchgeführt. |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | Nach der Entbindung wird die Wochenbettgymnastik von Physiotherapeuten und Hebammen durchgeführt. |
| MP51 | Wundmanagement | Das Wundmanagement umfasst die Anamnese, Behandlung, Dokumentation des Wundverlaufs sowie die begleitende Schmerztherapie. |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | Es besteht eine enge Kooperation mit den örtlichen Selbsthilfegruppen. Die Selbsthilfegruppen haben ein Büro im Krankenhaus, in dem regelmäßige Sprechstunden angeboten werden. |
| MP53 | Aromapflege/-therapie | |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
| MP62 | Snoezelen | |
| MP63 | Sozialdienst | Der Krankenhaussozialdienst bietet Patienten und deren Angehörigen in vielfältigen persönlichen und sozialen Fragen, die sich im Zusammenhang mit einer Erkrankung ergeben, kompetente Hilfe, Beratung und Unterstützung. |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | In Vorträgen informieren Chef- und Oberärzte über medizinische Themen sowie die Vorbeugung, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten verschiedener Erkrankungen. Weiterhin werden aktuelle Entwicklungen der Medizin sowie modernste diagnostische und therapeutische Verfahren vorgestellt. |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.), Spiegeltherapie |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Es bestehen Kooperationen zu örtlichen stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen. |

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------|---------------|-----|--|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | | | Die Stationen verfügen über zentrale Aufenthaltsräume bzw. Bereiche mit einem Sortiment aktueller Zeitschriften. |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | Die Wahlleistungsstationen sowie einzelne Stationen verfügen über Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle. |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|------------------------|-----|---|
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | | | Auf der Entbindungsstation befinden sich ein komfortable und gemütlich eingerichtetes "Familienzimmer" zum gemeinsamen Aufenthalt der Eltern inkl. Vollpension des Vaters. Hierbei handelt es sich um eine Wahlleistung. |
| NM07 | Rooming-in | | | Die Entbindungsstation bietet ein 24-Stunden-Rooming-In. |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | | Über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse hinaus ist die Unterbringung einer Begleitperson als Wahlleistung selbstverständlich möglich. |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | Die Wahlleistungsstationen sowie fast alle anderen Stationen verfügen über Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle. |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | 3,50 EUR pro Tag (max) | | Jedes Patientenzimmer ist mit einem Fernseher (Satellitenanschluss) ausgestattet. Die Nutzung des TV (26 Programme inkl. 7 Sky-Sender) ist über das Erwerben des Multimedia Paketes (3,50 EUR/Tag für 14 Tage) möglich. Kopfhörer erhalten Sie gratis am Empfang. Für Wahlleistungspatienten kostenlos. |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|-----|--|
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | 3,50 EUR pro Tag (max) | | Die Internetnutzung erfolgt per W-LAN. Der Zugang zum Internet erfolgt über Ihr persönliches Endgerät (Smartphone, Tablet etc.). Die Nutzung des Internets ist über das Erwerben des Multimedia Paketes (3,50 EUR/Tag für 14 Tage) möglich. Für Wahlleistungspatienten kostenlos. |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett | 0,00 EUR pro Tag (max) | | An jedem Patientenbett befindet sich ein Radio. Die Nutzung des Radios ist unentgeltlich. Gegen eine geringe Gebühr können Sie einen Kopfhörer an unserem Empfang erwerben. Für Wahlleistungspatienten kostenlos. Bei dem Kauf des Multimedia-Paketes ist der Kopfhörer kostenlos. |
| NM18 | Telefon am Bett | 3,50 EUR pro Tag (max) ins deutsche Festnetz 0,10 EUR pro Minute ins deutsche Festnetz 0,00 EUR bei eingehenden Anrufen | | Jedes Patientenbett verfügt über ein Telefon. Die Nutzung des Telefons ist über das Erwerben des Multimedia Paketes (3,50 EUR/Tag für 14 Tage) möglich. Für Wahlleistungspatienten fallen nur die Kosten pro Telefoneinheit an. |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | | | Auf den Wahlleistungsstationen befindet sich ein Tresor in jedem Zimmer. |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | 0 EUR pro Stunde (max) 0 EUR pro Tag | | In unmittelbarer Nähe des Krankenhauses stehen unseren Patienten und Besuchern kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | | | Das Krankenhaus verfügt über ein eigenes Bewegungsbad. |

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|-----|--|
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | | | Nach der administrativen Patientenaufnahme werden die Patienten von einer Pflegekraft auf der Station empfangen und in ihr Patientenzimmer begleitet. |
| NM42 | Seelsorge | | | Das Angebot der evangelischen und katholischen Krankenseelsorge richtet sich an alle Patienten und Angehörige, die ein Gespräch bzw. Beistand oder den Empfang von Abendmahl, Kommunion und Krankensalbung wünschen. |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | | | In regelmäßigen Abständen finden Fortbildungs- und Informationsabende für bestimmte Zielgruppen und die interessierte Öffentlichkeit statt. |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | | | Durch die gute Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, die auch Vorort erreichbar sind, können wir unseren Patienten den Kontakt vermitteln. |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | fleischlose Kost, Ausschluss bestimmter Speisen | | In dem vielschichtigen Speiseangebot finden auch individuelle bzw. kulturbedingte Ernährungsgewohnheiten Berücksichtigung. |
| NM67 | Andachtsraum | | | Das Krankenhaus verfügt über eine hauseigene Kapelle in der wöchentliche ökumenische Gottesdienste stattfinden. Weiterhin bietet ein Gebetsraum den Muslimen einen Ort für Gebete, Besinnung und Ruhe. |
| NM68 | Abschiedsraum | | | Das Krankenhaus verfügt über einen Abschiedsraum. |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
| BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE | |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF17 | geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergewicht, elektrisch verstellbar) | |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
| BF24 | Diätetische Angebote | |
| BF25 | Dolmetscherdienst | |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
| BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit“ | |

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Für den theoretischen Unterricht durch Lehrer für Pflegeberufe, Ärzten, Psychologen und Pflegekräfte steht ein Demonstrationsraum, eine gut sortierte Bibliothek zur Verfügung. Die praktische Ausbildung erfolgt überwiegend in den Fachabteilungen, aber auch in anderen Kliniken und amb. Einrichtungen. |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Wir bilden in Kooperation mit einer großen OTA-Schule aus. |

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

| | |
|-------------------|-----|
| Anzahl der Betten | 228 |
|-------------------|-----|

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle:

| | |
|--------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl: | 11059 |
| Teilstationäre Fallzahl: | 0 |
| Ambulante Fallzahl: | 17350 |

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 58,11 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 58,11 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 4 |
| Stationäre Versorgung | 54,11 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 33,08 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 33,08 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 2,25 |
| Stationäre Versorgung | 30,83 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 7 |
|-----------------|---|

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

A-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 169,96 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 169,96 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 10,39 |
| Stationäre Versorgung | 159,57 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 1,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,5 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,5 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 0,50 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,50 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,50 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 2 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,22 |
| Stationäre Versorgung | 1,78 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Medizinische Fachangestellte

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 34,46 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 34,46 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 8,35 |
| Stationäre Versorgung | 26,11 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| Spezielles therapeutisches Personal | Diätassistent und Diätassistentin (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,99 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,99 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,99 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Ergotherapeut und Ergotherapeutin (SP05) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,66 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,66 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,66 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin (SP15) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,30 |
| Stationäre Versorgung | 0,70 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Pädagoge und Pädagogin/Lehrer und Lehrerin (SP20) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 4,52 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,52 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,35 |
| Stationäre Versorgung | 3,17 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Physiotherapeut und Physiotherapeutin (SP21) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 11,81 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,81 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 5,08 |
| Stationäre Versorgung | 6,73 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialpädagogin und Sozialpädagoge (SP26) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,75 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,75 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,75 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie (SP27) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,40 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,40 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,40 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 5,76 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,76 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 5,76 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojtá (SP32) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,66 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,66 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,66 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin (SP35) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,25 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,25 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,25 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Heilpraktiker und Heilpraktikerin (SP39) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie (SP42) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) (SP55) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 4,68 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,68 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,42 |
| Stationäre Versorgung | 4,26 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA) (SP56) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 3,65 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,65 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,45 |
| Stationäre Versorgung | 2,20 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

| | |
|--------------------------------------|--|
| Name | Michael Ricken |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Stabstelle Qualitäts-, Prozessmanagement |
| Telefon | 05631 569 374 |
| Fax | 05631 569 500 |
| E-Mail | m.ricken@krankenhaus-korbach.de |

A-12.1.2 Lenkungsgremium

| | |
|---|-------------------------------|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Erweiterte Krankenhausleitung |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | monatlich |

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |
|---|--|

A-12.2.2 Lenkungsgremium

| | |
|--|--|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? | ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement |
|--|--|

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|---|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM05 | Schmerzmanagement | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM06 | Sturzprophylaxe | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | <input checked="" type="checkbox"/> Tumorkonferenzen <input checked="" type="checkbox"/> Palliativbesprechungen <input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel |
| RM11 | Standards zur sicheren Medikamentenvergabe | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|--|--|
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |
| RM18 | Entlassungsmanagement | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation 2017-12-31 |

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| | |
|--|--|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz | quartalsweise |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | OP-Checklisten |

Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr. | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 2017-12-31 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | halbjährlich |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | halbjährlich |

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| | |
|---|--|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz | quartalsweise |

Einrichtungübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungübergreifendes Fehlermeldesystem |
|--------|---|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements

A-12.3.1 Hygienepersonal

| | | |
|---|--|---|
| Krankenhausthygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | Extern: Kooperation mit dem Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle IKI, PD Dr. Pitten, Gießen Intern: 0,5 VK curricular fortgebildeter Krankenhaushygieniker |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 6 | Hygienebeauftragte Ärzte in allen Fachabteilungen |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 1 | 1 VK |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 9 | |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission | halbjährlich | |

Vorsitzender der Hygienekommission

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Arved-Winfried Schneider |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Leiter, Chefarzt Medizinische Klinik |
| Telefon | 05631 569 156 |
| Fax | 05631 569 342 |
| E-Mail | innere@krankenhaus-korbach.de |

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| | |
|---|--|
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|---|--|

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Hygienische Händedesinfektion | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaut | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> nein |

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaphylaxe und Antibiotikatherapie

| | |
|--|--|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaphylaxe liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaphylaxe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaphylaxe? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaphylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> nein |

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| | |
|--|--|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--|--|

Der interne Standard thematisiert insbesondere:

| | |
|--|--|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | teilweise |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.4 Händedesinfektion

| | |
|---|--|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 20 ml/Patiententag |
| Ist eine Intensivstation vorhanden? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 81 ml/Patiententag |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| | |
|--|--|
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html)? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen? | teilweise |

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|------|--|---|--|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> HAND-KISS <input checked="" type="checkbox"/> OP-KISS <input checked="" type="checkbox"/> STATIONS-KISS | Das Stadtkrankenhaus ist beim Nationalen Referenzzentrum für die Surveillance von nosokomialen Infektionen mit Modulen HAND-KISS, OP-KISS und Stations-KISS angemeldet. Die Erfassung auf der Intensiv erfolgt analog zum ITS-KISS. |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen | MRE-Netzwerk Nord-Osthessen | Das Stadtkrankenhaus Korbach ist Mitglied im MRE-Netzwerk Nord-Osthessen (http://mre-nord-ost-hessen.de/mitglieder/). |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) | Teilnahme (ohne Zertifikat) | Das Stadtkrankenhaus Korbach nimmt seit 2008 freiwillig an der „Aktion Saubere Hände“ teil (http://www.aktion-sauberehaende.de/ash/global/teilnehmende-einrichtungen/krankenhaeuser/). |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | | Die Aufbereitung und nachfolgende Sterilisation von Medizinprodukten wird durch externe Dienstleister sichergestellt. Die Aufbereitung erfolgt mit validierten Verfahren. Die erneute Leistungsprüfung (Re-Validierung) erfolgt gesetzeskonform. Die Ergebnisse werden dem Krankenhaus mitgeteilt. |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | | Auf Wunsch können in den einzelnen Pflege- und Funktionsbereichen oder Fachabteilungen Hygieneschulungen zu besonderen Fragestellungen stattfinden. |

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| | | |
|---|--|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Ein Patientenführsprecher oder eine Patientenführsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Patientenbefragungen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Einweiserbefragungen | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Gerlinde Stremme | Beschwerdemanagement | 05631 569 371 | 05631 569 500 | g.stremme@krankenhaus-korbach.de |

Patientenführsprecher oder Patientenführsprecherin

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|
| Walter Meier | Patientenführsprecher | 05631 569 217 | | info@krankenhaus-korbach.de |

A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|-----|---|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Ja | |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der radiologischen Praxis, die sich im Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der neurologischen Praxis, die sich am Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | |
| AA18 | Hochfrequenztherapiegerät | Gerät zur Gewebeerstörung mittels Hochtemperaturtechnik | | |
| AA21 | Lithotripter (ESWL) | Stoßwellen-Steinzerstörung | | In Kooperation. Wird von der Urologie zur Steinzertrümmerung verwendet. Bei verzögerter Knochenheilung wird es auch von der Chirurgie eingesetzt. |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der radiologischen Praxis, die sich am Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA23 | Mammographiegerät | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der radiologischen Praxis, die sich am Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA32 | Szintigraphiescanner/Gammasonde | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der radiologischen Praxis, die sich am Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung | Ja | Die Untersuchung wird in Kooperation mit der urologischen Praxis, die sich am Krankenhaus befindet, durchgeführt. |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | 7-fach vorhanden |
| AA50 | Kapselendoskop | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung | Ja | |

Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-1.1 Innere Medizin

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Innere Medizin |
| Fachabteilungsschlüssel | 0100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|---------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/medizinische-klinik/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dr. med. Arved-Winfried Schneider | Chefarzt Medizinische Klinik | 05631 / 569 - 156 | 05631 / 569 - 342 | Innere@krankenhaus-korbach.de |

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-1.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VA02 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | In der Diagnostik der pulmonalen Herzkrankheit werden sowohl nichtinvasive Verfahren wie Duplex, Echokardiographie als auch invasive Verfahren wie Rechtsherzkatheter-Untersuchungen eingesetzt. |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | Zur Therapie von ischämischen Herzkrankheiten steht das Herzkatheterlabor zur Verfügung, in dem therapeutisch auch Dilatationen und Stent-Implantationen durchgeführt werden. |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | Für die Diagnostik der Erkrankungen der Arterien stehen Doppler-, Duplexsonographie sowie Angiographie und MRT-Angio zur Verfügung. |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | Zur Diagnostik von cerebrovaskulären Erkrankungen werden die Duplexsonographie sowie Angio-CT und Kernspintomographie eingesetzt; ggf. Lyse-Therapie; telemedizinische Verbindung zu einer neurologischen Abteilung; Schulungs- und Beratungsangebot über den stat. Aufenthalt hinaus. |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | Zur Diagnostik der arteriellen Hypertonie stehen sämtliche relevanten diagnostischen Möglichkeiten zur Verfügung. Die Therapie umfasst neben einer strukturierten Medikation auch die Anleitung zu Lebensstiländerungen. |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Durch den hämatologisch / onkologischen Oberarzt der Abteilung sind u. a. zeitnahe Beurteilungen von Blutbildveränderungen möglich. |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | Gastroskopie, Doppelballonenteroskopie, Kapsel- Endoskopie, Colonoskopie, Rektoskopie, Endosonographie sowie Chromoendoskopie, ERCP, Laparoskopie |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Die Untersuchung des Enddarmes wird mittels Proktoskopie durchgeführt. Hämorrhoidalleiden können mittels Sklerosierung sowie Gummibandligatur behandelt werden. |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Zur Diagnostik von Atemwegserkrankungen stehen neben der Lungenfunktionsprüfung die Bronchoskopie sowie Schnittbildverfahren von CT und MRT zur Verfügung. |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Anwendung aller modernen Schnittbildtechniken und endoskopischen Verfahren; sonographisch und CT-gesteuerte Punktionen von verdächtigen Herden werden durchgeführt. Die Behandlung wird durch ein interdisz. Tumor-Board festgelegt. Die Behandlung kann auch ambulant oder in der CA-Ambulanz erfolgen. |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI21 | Betreuung von Patienten und Patientinnen vor und nach Transplantation | |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Die Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen erfolgt in Zusammenarbeit mit der Geriatrischen Einheit, die sich mit der Inneren Medizin unter gemeinschaftlicher Leitung befindet. |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | Schrittmachersprechstunde, Koronarsprechstunde, Sprechstunde für Krankheiten der Leber, Onkologische Sprechstunde |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | Die Therapie von Herz-, Rhythmusstörungen umfasst neben der medikamentösen Therapie auch die Implantation von Defibrillatoren. |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | |
| VI35 | Endoskopie | Abtragung von Polypen des Magen-Darm-Traktes, Mukosektomie, Dehnung (Dilatation) von Engstellen im Magen-/ Darmtrakt und den Gallenwegen; Überbrückung durch Stents, Entfernung von Steinen aus den Gangsystemen; Blutstillung im Magen- Darm-Trakt; Argon-Beamer, Ligatur, Clips, Beh. von Ösophagusvarizen. |
| VI37 | Onkologische Tagesklinik | Chemotherapien werden ambulant in der Ermächtigungsambulanz des Chefarztes durchgeführt. |
| VI38 | Palliativmedizin | Die Abteilung ist im Palliativ- und Hospiz-Netzwerk Waldeck-Frankenberg e.V. engagiert. |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VX00 | Diagnostik und Therapie des Schlaganfalls | 24-stündige CT und MRT Verfügbarkeit; spezielle Einheit für Patienten mit einem akuten Schlaganfall; ggf. Lyse-Therapie; telemedizinische Verbindung zu einer neurologischen Abteilung; Beratungs- und Schulungsangebot über der stat. Aufenthalt hinaus. |
| VX00 | H2-Atemtests zur Diagnose der Lactose- bzw. Fructose-Unverträglichkeit | |
| VX00 | Onkologie | Diagnostik: Endoskopie, Sonographie, konv. Radiologie, Laborchemie, CT und MRT; Therapie: stat oder amb. Chemotherapien, Bestrahlungstherapien im Klinikum Kassel od. Uni-Klinik Marburg |

B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-1.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4959 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-1.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| I50.1 | 281 | Linksherzinsuffizienz |
| F10.0 | 154 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E86 | 144 | Volumenmangel |
| J18.8 | 136 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| I10.0 | 131 | Benigne essentielle Hypertonie |
| I25.1 | 116 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I21.4 | 114 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| K29.1 | 100 | Sonstige akute Gastritis |
| R55 | 100 | Synkope und Kollaps |
| I50.0 | 92 | Rechtsherzinsuffizienz |
| J18.9 | 83 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I48.0 | 78 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I11.9 | 75 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| K57.3 | 73 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| J44.1 | 67 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| H81.2 | 63 | Neuropathia vestibularis |
| K29.3 | 62 | Chronische Oberflächengastritis |
| A09.9 | 55 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| I63.8 | 55 | Sonstiger Hirninfarkt |
| J18.2 | 53 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| R42 | 48 | Schwindel und Taumel |
| K56.4 | 46 | Sonstige Obturation des Darmes |
| N39.0 | 46 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| R07.3 | 46 | Sonstige Brustschmerzen |
| R07.4 | 46 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | 43 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| G45.8 | 41 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome |
| I20.0 | 41 | Instabile Angina pectoris |
| G40.8 | 39 | Sonstige Epilepsien |
| A46 | 37 | Erysipel [Wundrose] |
| K25.3 | 35 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| F41.0 | 32 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| K59.0 | 32 | Obstipation |
| J18.1 | 31 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| A41.5 | 30 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| K56.6 | 28 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| I26.9 | 27 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| J20.8 | 27 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| A41.1 | 24 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I11.0 | 24 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz |
| I21.0 | 24 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| M54.1 | 24 | Radikulopathie |
| B99 | 23 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| K80.3 | 23 | Gallengangsstein mit Cholangitis |
| I21.1 | 22 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I63.3 | 22 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| J44.0 | 22 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| A04.7 | 21 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| I47.1 | 21 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| I80.2 | 21 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| Z45.0 | 21 | Anpassung und Handhabung eines kardialen (elektronischen) Geräts |
| J20.9 | 20 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| R11 | 20 | Übelkeit und Erbrechen |
| F10.3 | 19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| G44.2 | 19 | Spannungskopfschmerz |
| R07.2 | 18 | Präkordiale Schmerzen |
| R56.8 | 18 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| G40.1 | 17 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| A41.8 | 16 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| D50.8 | 16 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D46.7 | 15 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| I49.8 | 15 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| K83.1 | 15 | Verschluss des Gallenganges |
| G43.1 | 14 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| I95.1 | 14 | Orthostatische Hypotonie |
| K22.1 | 14 | Ösophagusulkus |
| K50.8 | 14 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| N17.9 | 14 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| I20.8 | 13 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| I44.2 | 13 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| K21.0 | 13 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| K52.8 | 13 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K74.6 | 13 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| E11.6 | 12 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| F45.0 | 12 | Somatisierungsstörung |
| G51.0 | 12 | Fazialisparese |
| I49.5 | 12 | Sick-Sinus-Syndrom |
| K25.0 | 12 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K29.0 | 12 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| R04.0 | 12 | Epistaxis |
| K92.1 | 11 | Meläna |
| M54.2 | 11 | Zervikalneuralgie |
| E11.9 | 10 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen |
| I35.0 | 10 | Aortenklappenstenose |
| I49.3 | 10 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| K50.0 | 10 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K63.5 | 10 | Polyp des Kolons |
| K83.0 | 10 | Cholangitis |
| R06.0 | 10 | Dyspnoe |
| R51 | 10 | Kopfschmerz |
| T78.3 | 10 | Angioneurotisches Ödem |
| C20 | 9 | Bösartige Neubildung des Rektums |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| C25.0 | 9 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C34.3 | 9 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| C61 | 9 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C92.1 | 9 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv |
| G45.0 | 9 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik |
| I63.5 | 9 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| K70.3 | 9 | Alkoholische Leberzirrhose |
| N20.0 | 9 | Nierenstein |
| N30.0 | 9 | Akute Zystitis |
| C16.0 | 8 | Bösartige Neubildung: Kardial |
| C25.2 | 8 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| G45.1 | 8 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig) |
| I42.0 | 8 | Dilatative Kardiomyopathie |
| I63.4 | 8 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| J06.0 | 8 | Akute Laryngopharyngitis |
| K85.1 | 8 | Biliäre akute Pankreatitis |
| K85.2 | 8 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis |
| M47.8 | 8 | Sonstige Spondylose |
| R53 | 8 | Unwohlsein und Ermüdung |
| A08.1 | 7 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| A09.0 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| C34.0 | 7 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| E87.5 | 7 | Hyperkaliämie |
| I26.0 | 7 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I47.2 | 7 | Ventrikuläre Tachykardie |
| J18.0 | 7 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J40 | 7 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| J90 | 7 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K29.6 | 7 | Sonstige Gastritis |
| K50.1 | 7 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K52.9 | 7 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K55.2 | 7 | Angiodysplasie des Kolons |
| K64.1 | 7 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| N10 | 7 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| R10.1 | 7 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R13.9 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| A41.0 | 6 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| D47.1 | 6 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
| E11.2 | 6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen |
| E11.7 | 6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| G43.8 | 6 | Sonstige Migräne |
| G45.2 | 6 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien |
| G58.0 | 6 | Interkostalneuropathie |
| I48.1 | 6 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I61.0 | 6 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| K20 | 6 | Ösophagitis |
| K25.9 | 6 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K29.5 | 6 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K56.0 | 6 | Paralytischer Ileus |
| K56.7 | 6 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K85.0 | 6 | Idiopathische akute Pankreatitis |
| K85.8 | 6 | Sonstige akute Pankreatitis |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| M54.8 | 6 | Sonstige Rückenschmerzen |
| N18.5 | 6 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| R00.1 | 6 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.2 | 6 | Palpitationen |
| R10.4 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R63.4 | 6 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| C22.0 | 5 | Leberzellkarzinom |
| C34.1 | 5 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| D59.8 | 5 | Sonstige erworbene hämolytische Anämien |
| D70.1 | 5 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie |
| F43.0 | 5 | Akute Belastungsreaktion |
| G20.1 | 5 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| G50.0 | 5 | Trigeminusneuralgie |
| H81.3 | 5 | Sonstiger peripherer Schwindel |
| I49.0 | 5 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| K22.6 | 5 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K26.0 | 5 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.3 | 5 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K51.0 | 5 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K60.0 | 5 | Akute Analfissur |
| K80.0 | 5 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| K80.1 | 5 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| K80.2 | 5 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| K80.4 | 5 | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| K80.5 | 5 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis |
| L27.0 | 5 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| R00.0 | 5 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R18 | 5 | Aszites |
| R20.2 | 5 | Parästhesie der Haut |
| R40.0 | 5 | Somnolenz |
| T82.1 | 5 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| A04.5 | 4 | Enteritis durch Campylobacter |
| A40.8 | 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| C15.5 | 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C90.0 | 4 | Multiples Myelom |
| D37.7 | 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| D50.0 | 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| D64.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| E11.4 | 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen |
| F10.1 | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F10.4 | 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| G45.4 | 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode] |
| H81.8 | 4 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| I10.9 | 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet |
| I20.1 | 4 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| I21.2 | 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I31.3 | 4 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I40.0 | 4 | Infektiöse Myokarditis |
| I48.2 | 4 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.3 | 4 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | 4 | Vorhofflattern, atypisch |
| I65.2 | 4 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| J01.8 | 4 | Sonstige akute Sinusitis |
| J03.8 | 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J22 | 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J41.1 | 4 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| J44.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit |
| J98.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege |
| K52.1 | 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| M48.0 | 4 | Spinal(kanal)stenose |
| M79.1 | 4 | Myalgie |
| M79.6 | 4 | Schmerzen in den Extremitäten |
| S06.0 | 4 | Gehirnerschütterung |
| T75.4 | 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C25.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C34.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C48.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C67.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C91.6 | < 4 | Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| E83.5 | < 4 | Störungen des Kalziumstoffwechsels |
| E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| F12.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F32.1 | < 4 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.8 | < 4 | Sonstige depressive Episoden |
| F41.2 | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| G35.1 | < 4 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| H81.0 | < 4 | Ménière-Krankheit |
| H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| I25.5 | < 4 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I30.8 | < 4 | Sonstige Formen der akuten Perikarditis |
| I31.9 | < 4 | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| I44.1 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I67.4 | < 4 | Hypertensive Enzephalopathie |
| I95.2 | < 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| J04.0 | < 4 | Akute Laryngitis |
| J15.0 | < 4 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J41.0 | < 4 | Einfache chronische Bronchitis |
| J44.9 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J84.1 | < 4 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose |
| K22.2 | < 4 | Ösophagusverschluss |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K56.5 | < 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K63.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| M47.2 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie |
| N17.8 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R10.3 | < 4 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R50.8 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| R52.2 | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S22.0 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels |
| S72.1 | < 4 | Pertrochantäre Fraktur |
| T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| B15.9 | < 4 | Virushepatitis A ohne Coma hepaticum |
| B17.2 | < 4 | Akute Virushepatitis E |
| B18.1 | < 4 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus |
| C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C21.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C78.7 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C79.3 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C82.1 | < 4 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| C91.1 | < 4 | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL] |
| C92.0 | < 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML] |
| C94.2 | < 4 | Akute Megakaryoblastenleukämie |
| D37.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon |
| D46.1 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten |
| D61.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien |
| E10.1 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose |
| E10.6 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| E10.9 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen |
| F01.8 | < 4 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F06.3 | < 4 | Organische affektive Störungen |
| F10.5 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| F15.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F44.5 | < 4 | Dissoziative Krampfanfälle |
| G30.1 | < 4 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.5 | < 4 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G41.2 | < 4 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G45.9 | < 4 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet |
| G81.0 | < 4 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| I21.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I35.2 | < 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I40.8 | < 4 | Sonstige akute Myokarditis |
| I61.5 | < 4 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I70.2 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| I71.4 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I72.8 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien |
| I80.1 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.3 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I80.8 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J06.9 | < 4 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J12.2 | < 4 | Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| J32.4 | < 4 | Chronische Pansinusitis |
| J34.2 | < 4 | Nasenseptumdeviation |
| J36 | < 4 | Peritonsillarabszess |
| J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| J45.1 | < 4 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| J67.9 | < 4 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub |
| J93.1 | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| J96.0 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert |
| J98.0 | < 4 | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert |
| K22.0 | < 4 | Achalasie der Kardia |
| K25.4 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.4 | < 4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K29.8 | < 4 | Duodenitis |
| K51.3 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K57.1 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K57.9 | < 4 | Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation oder Abszess |
| K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| K62.4 | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K63.3 | < 4 | Darmulkus |
| K71.2 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis |
| K71.9 | < 4 | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K76.7 | < 4 | Hepatorenales Syndrom |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L08.0 | < 4 | Pyodermie |
| L12.0 | < 4 | Bullöses Pemphigoid |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| N13.2 | < 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N92.0 | < 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| Q24.5 | < 4 | Fehlbildung der Koronargefäße |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| Q44.6 | < 4 | Zystische Leberkrankheit [Zystenleber] |
| R04.2 | < 4 | Hämoptoe |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R20.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| R22.1 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Hals |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| R45.1 | < 4 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| R47.1 | < 4 | Dysarthrie und Anarthrie |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| S22.4 | < 4 | Rippenserienfraktur |
| S30.0 | < 4 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S72.0 | < 4 | Schenkelhalsfraktur |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S82.1 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| Z92.1 | < 4 | Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese |
| A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| A16.3 | < 4 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| A40.0 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.1 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A68.1 | < 4 | Durch Zecken übertragenes Rückfallfieber |
| B00.1 | < 4 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren |
| B02.3 | < 4 | Zoster ophthalmicus |
| B17.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete akute Virushepatitis |
| B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| B27.8 | < 4 | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| B34.9 | < 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| B37.8 | < 4 | Kandidose an sonstigen Lokalisationen |
| B59 | < 4 | Pneumozystose |
| C07 | < 4 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| C16.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C21.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C22.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C25.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C26.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C34.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C43.4 | < 4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | < 4 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C44.3 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C45.0 | < 4 | Mesotheliom der Pleura |
| C48.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C49.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C60.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| C67.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C68.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C71.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C73 | < 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C76.0 | < 4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C76.2 | < 4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C81.7 | < 4 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C84.4 | < 4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C85.2 | < 4 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C91.0 | < 4 | Akute lymphatische Leukämie [ALL] |
| C92.3 | < 4 | Myelosarkom |
| C93.1 | < 4 | Chronische myelomonozytäre Leukämie |
| D01.4 | < 4 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Darmes |
| D10.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zunge |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D13.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Magen |
| D13.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| D17.5 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intraabdominalen Organe |
| D18.0 | < 4 | Hämangiom |
| D30.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Niere |
| D36.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem |
| D43.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Gehirn, supratentoriell |
| D43.2 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| D46.9 | < 4 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D47.4 | < 4 | Osteomyelofibrose |
| D52.0 | < 4 | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie |
| D52.8 | < 4 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| D53.1 | < 4 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| D56.0 | < 4 | Alpha-Thalassämie |
| D59.1 | < 4 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| D61.1 | < 4 | Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie |
| D62 | < 4 | Akute Blutungsanämie |
| D64.9 | < 4 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D68.5 | < 4 | Primäre Thrombophilie |
| D69.3 | < 4 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| D69.5 | < 4 | Sekundäre Thrombozytopenie |
| D72.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E05.8 | < 4 | Sonstige Hyperthyreose |
| E06.3 | < 4 | Autoimmunthyreoiditis |
| E11.0 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma |
| E11.1 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose |
| E11.3 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| E16.1 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie |
| E16.2 | < 4 | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet |
| E44.0 | < 4 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E53.8 | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| E73.8 | < 4 | Sonstige Laktoseintoleranz |
| E84.0 | < 4 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen |
| E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| F03 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| F06.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F13.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F14.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F23.9 | < 4 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F31.2 | < 4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.3 | < 4 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.1 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F41.1 | < 4 | Generalisierte Angststörung |
| F44.8 | < 4 | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] |
| F45.3 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung |
| F45.4 | < 4 | Anhaltende Schmerzstörung |
| F48.8 | < 4 | Sonstige neurotische Störungen |
| F55.2 | < 4 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika |
| F60.3 | < 4 | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung |
| F63.8 | < 4 | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle |
| G00.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Meningitis |
| G03.8 | < 4 | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| G12.2 | < 4 | Motoneuron-Krankheit |
| G23.1 | < 4 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] |
| G23.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien |
| G25.0 | < 4 | Essentieller Tremor |
| G25.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| G35.0 | < 4 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G35.2 | < 4 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf |
| G40.3 | < 4 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G43.0 | < 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G43.2 | < 4 | Status migraenosus |
| G43.9 | < 4 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| G51.1 | < 4 | Entzündung des Ganglion geniculi |
| G51.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten des N. facialis |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G61.0 | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| G62.1 | < 4 | Alkohol-Polyneuropathie |
| G62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| G83.2 | < 4 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G93.4 | < 4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G93.6 | < 4 | Hirnödem |
| G93.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns |
| H25.8 | < 4 | Sonstige senile Kataraktformen |
| H34.1 | < 4 | Verschluss der A. centralis retinae |
| H34.2 | < 4 | Sonstiger Verschluss retinaler Arterien |
| H53.0 | < 4 | Amblyopia ex anopsia |
| H53.1 | < 4 | Subjektive Sehstörungen |
| H53.2 | < 4 | Diplopie |
| H53.4 | < 4 | Gesichtsfelddefekte |
| H53.8 | < 4 | Sonstige Sehstörungen |
| H60.0 | < 4 | Abszess des äußeren Ohres |
| H65.4 | < 4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media |
| H66.0 | < 4 | Akute eitrig Otitis media |
| H70.0 | < 4 | Akute Mastoiditis |
| H73.0 | < 4 | Akute Myringitis |
| H81.9 | < 4 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| H93.1 | < 4 | Tinnitus aurium |
| I20.9 | < 4 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| I23.5 | < 4 | Papillarmuskeleruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I24.8 | < 4 | Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit |
| I25.4 | < 4 | Koronararterienaneurysma |
| I27.0 | < 4 | Primäre pulmonale Hypertonie |
| I27.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| I30.0 | < 4 | Akute unspezifische idiopathische Perikarditis |
| I30.1 | < 4 | Infektiöse Perikarditis |
| I31.2 | < 4 | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert |
| I31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards |
| I35.1 | < 4 | Aortenklappeninsuffizienz |
| I35.8 | < 4 | Sonstige Aortenklappenkrankheiten |
| I40.9 | < 4 | Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I42.2 | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie |
| I45.5 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| I45.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| I46.9 | < 4 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I51.3 | < 4 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert |
| I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I61.1 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I62.0 | < 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch) |
| I63.0 | < 4 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.2 | < 4 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I66.8 | < 4 | Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien |
| I67.3 | < 4 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| I67.5 | < 4 | Moyamoya-Syndrom |
| I67.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| I71.0 | < 4 | Dissektion der Aorta |
| I71.2 | < 4 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.3 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I73.0 | < 4 | Raynaud-Syndrom |
| I74.1 | < 4 | Embolie und Thrombose sonstiger und nicht näher bezeichneter Abschnitte der Aorta |
| I74.2 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I74.9 | < 4 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Arterie |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I89.0 | < 4 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| I95.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| I99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems |
| J00 | < 4 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] |
| J01.3 | < 4 | Akute Sinusitis sphenoidalis |
| J02.8 | < 4 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J05.1 | < 4 | Akute Epiglottitis |
| J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| J11.1 | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| J15.1 | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.6 | < 4 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J20.2 | < 4 | Akute Bronchitis durch Streptokokken |
| J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| J32.2 | < 4 | Chronische Sinusitis ethmoidalis |
| J38.4 | < 4 | Larynxödem |
| J38.5 | < 4 | Laryngospasmus |
| J43.8 | < 4 | Sonstiges Emphysem |
| J45.8 | < 4 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| J68.2 | < 4 | Entzündung der oberen Atemwege durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe, anderenorts nicht klassifiziert |
| J80.0 | < 4 | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| J93.0 | < 4 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| J93.9 | < 4 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet |
| J94.2 | < 4 | Hämatothorax |
| K11.2 | < 4 | Sialadenitis |
| K12.2 | < 4 | Phlegmone und Abszess des Mundes |
| K12.3 | < 4 | Orale Mukositis (ulzerativ) |
| K13.0 | < 4 | Krankheiten der Lippen |
| K14.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten der Zunge |
| K22.4 | < 4 | Dyskinesie des Ösophagus |
| K22.7 | < 4 | Barrett-Ösophagus |
| K26.9 | < 4 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K31.1 | < 4 | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| K31.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K51.9 | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| K52.2 | < 4 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| K55.8 | < 4 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K59.1 | < 4 | Funktionelle Diarrhoe |
| K62.1 | < 4 | Rektumpolyp |
| K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K64.4 | < 4 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| K70.4 | < 4 | Alkoholisches Leberversagen |
| K71.7 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| K74.0 | < 4 | Leberfibrose |
| K75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K82.1 | < 4 | Hydrops der Gallenblase |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege |
| K85.9 | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| K86.0 | < 4 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| K86.1 | < 4 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| K86.2 | < 4 | Pankreaszyste |
| K86.3 | < 4 | Pseudozyste des Pankreas |
| K90.0 | < 4 | Zöliakie |
| K92.0 | < 4 | Hämatemesis |
| L03.1 | < 4 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| L03.8 | < 4 | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen |
| L23.5 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte |
| L27.2 | < 4 | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel |
| L28.0 | < 4 | Lichen simplex chronicus [Vidal] |
| L50.0 | < 4 | Allergische Urtikaria |
| L89.9 | < 4 | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet |
| M06.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit |
| M10.0 | < 4 | Idiopathische Gicht |
| M13.1 | < 4 | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert |
| M16.0 | < 4 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M16.1 | < 4 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| M41.8 | < 4 | Sonstige Formen der Skoliose |
| M42.1 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen |
| M46.4 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| M48.2 | < 4 | Baastrup-Syndrom |
| M53.0 | < 4 | Zervikozephalisches Syndrom |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| M60.0 | < 4 | Infektiöse Myositis |
| M60.8 | < 4 | Sonstige Myositis |
| M60.9 | < 4 | Myositis, nicht näher bezeichnet |
| M62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| M79.2 | < 4 | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet |
| M80.8 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| M89.5 | < 4 | Osteolyse |
| N13.0 | < 4 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N18.3 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| N40 | < 4 | Prostatahyperplasie |
| O13 | < 4 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O22.3 | < 4 | Tiefe Venenthrombose in der Schwangerschaft |
| R05 | < 4 | Husten |
| R06.6 | < 4 | Singultus |
| R07.0 | < 4 | Halsschmerzen |
| R09.1 | < 4 | Pleuritis |
| R14 | < 4 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| R15 | < 4 | Stuhlinkontinenz |
| R19.0 | < 4 | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken |
| R19.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen |
| R22.4 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten |
| R26.3 | < 4 | Immobilität |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R32 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R40.1 | < 4 | Sopor |
| R41.3 | < 4 | Sonstige Amnesie |
| R45.0 | < 4 | Nervosität |
| R47.0 | < 4 | Dysphasie und Aphasie |
| R57.0 | < 4 | Kardiogener Schock |
| R57.1 | < 4 | Hypovolämischer Schock |
| R57.2 | < 4 | Septischer Schock |
| R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| R63.0 | < 4 | Anorexie |
| R63.5 | < 4 | Abnorme Gewichtszunahme |
| R64 | < 4 | Kachexie |
| R74.8 | < 4 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| R93.1 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Herzens und des Koronarkreislaufes |
| R94.3 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| S01.0 | < 4 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S02.2 | < 4 | Nasenbeinfraktur |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S27.3 | < 4 | Sonstige Verletzungen der Lunge |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.0 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels |
| S37.3 | < 4 | Verletzung der Harnröhre |
| S42.2 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| S46.2 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S80.0 | < 4 | Prellung des Knies |
| S82.0 | < 4 | Fraktur der Patella |
| S83.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen) Seitenbandes |
| S86.1 | < 4 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| T00.3 | < 4 | Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Regionen der unteren Extremität(en) |
| T17.2 | < 4 | Fremdkörper im Rachen |
| T17.4 | < 4 | Fremdkörper in der Trachea |
| T42.6 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T43.8 | < 4 | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T46.1 | < 4 | Vergiftung: Kalziumantagonisten |
| T50.9 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T65.9 | < 4 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz |
| T78.0 | < 4 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| T78.4 | < 4 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.3 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |
| T83.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T84.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| T85.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt |
| T85.5 | < 4 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| T88.1 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Impfung [Immunisierung], anderenorts nicht klassifiziert |

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-930 | 1449 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-632.0 | 1033 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 3-200 | 868 | Native Computertomographie des Schädels |
| 1-440.a | 812 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-207.0 | 461 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 9-984.7 | 415 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 1-444.7 | 401 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.2 | 387 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 3-222 | 359 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 8-83b.c0c | 285 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 1-275.0 | 275 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 8-561.1 | 270 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-800.c0 | 245 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-984.8 | 237 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 3-820 | 236 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-710 | 234 | Ganzkörperplethysmographie |
| 3-225 | 231 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 9-320 | 209 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 3-052 | 199 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 8-837.00 | 198 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie |
| 5-452.60 | 159 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 8-83b.c4 | 158 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 1-275.2 | 152 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 9-984.9 | 117 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 1-242 | 102 | Audiometrie |
| 1-650.1 | 101 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 3-056 | 95 | Endosonographie des Pankreas |
| 1-208.8 | 94 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 8-837.m0 | 94 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie |
| 1-208.2 | 90 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-831.0 | 88 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-620.01 | 83 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 1-275.3 | 80 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 8-83b.c6 | 73 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 3-220 | 66 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-191.5 | 66 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 1-266.0 | 62 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 3-13b | 61 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 8-706 | 60 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-837.m1 | 58 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 1-444.6 | 57 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 3-600 | 57 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 8-701 | 57 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-771 | 56 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 5-452.63 | 55 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 3-207 | 54 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 1-640 | 51 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-774 | 51 | Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) |
| 3-055 | 51 | Endosonographie der Gallenwege |
| 3-202 | 50 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-513.b | 48 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 3-802 | 47 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-513.f0 | 46 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-513.21 | 45 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 8-987.10 | 45 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 9-984.a | 42 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-651 | 41 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 1-279.a | 40 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung |
| 1-642 | 40 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 5-513.1 | 40 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 1-653 | 39 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-636.1 | 38 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik |
| 9-200.01 | 38 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 9-984.6 | 34 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 9-984.b | 34 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 8-854.2 | 33 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-275.5 | 31 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 1-844 | 31 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 8-020.8 | 30 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-152.1 | 29 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 3-203 | 28 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-825 | 28 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-431.20 | 28 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 8-982.1 | 28 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-206 | 27 | Neurographie |
| 1-650.0 | 26 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 5-377.30 | 26 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne anti-tachykarde Stimulation |
| 1-610.0 | 25 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 3-821 | 24 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 1-480.5 | 23 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken |
| 3-82x | 23 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel |
| 1-632.1 | 22 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 8-800.c1 | 22 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 1-275.1 | 21 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel |
| 1-424 | 21 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 5-469.d3 | 21 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 8-640.0 | 21 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 5-469.e3 | 20 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 9-200.02 | 20 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 3-800 | 19 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 5-377.8 | 19 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 1-273.1 | 18 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie |
| 3-824.0 | 18 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe |
| 5-493.0 | 18 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 8-640.1 | 18 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 3-058 | 17 | Endosonographie des Rektums |
| 6-002.j4 | 17 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg |
| 9-200.1 | 17 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 1-430.2 | 16 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 3-823 | 16 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 8-831.5 | 16 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 1-205 | 15 | Elektromyographie (EMG) |
| 8-132.3 | 15 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-642 | 15 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-837.m3 | 15 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie |
| 8-982.2 | 15 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-208.6 | 14 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-442.0 | 14 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 5-449.e3 | 14 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-513.20 | 14 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-900.04 | 14 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 8-133.0 | 14 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 1-313 | 13 | Ösophagusmanometrie |
| 1-63a | 13 | Kapselendoskopie des Dünndarms |
| 3-822 | 13 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 5-493.1 | 13 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung |
| 8-148.0 | 13 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 1-266.1 | 12 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) |
| 5-399.5 | 12 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 8-153 | 12 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-522.d1 | 12 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 1-620.00 | 11 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-853.2 | 11 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 5-377.50 | 11 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion |
| 5-378.07 | 11 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 9-200.5 | 11 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 3-051 | 10 | Endosonographie des Ösophagus |
| 5-429.e | 10 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 5-469.h3 | 10 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 5-572.1 | 10 | Zystostomie: Perkutan |
| 8-83b.01 | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Biolimus-A9-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 8-83b.b6 | 10 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzender Ballon an Koronargefäßen |
| 3-137 | 9 | Ösophagographie |
| 3-221 | 9 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 8-607.0 | 9 | Hypothermiebehandlung: Invasive Kühlung durch Anwendung eines speziellen Kühlkatheters |
| 8-837.01 | 9 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien |
| 1-447 | 8 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 1-654.0 | 8 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 3-031 | 8 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 3-05g.0 | 8 | Endosonographie des Herzens: Intravaskulärer Ultraschall der Koronargefäße [IVUS] |
| 3-206 | 8 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-70c.x | 8 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige |
| 8-542.11 | 8 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-83b.00 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-982.0 | 8 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-441.0 | 7 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 3-05f | 7 | Transbronchiale Endosonographie |
| 3-205 | 7 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-377.1 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-399.7 | 7 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-449.d3 | 7 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-452.61 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-513.f1 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbst-expandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 6-002.j3 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| 8-837.m2 | 7 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien |
| 1-275.4 | 6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-442.2 | 6 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas |
| 1-445 | 6 | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt |
| 3-828 | 6 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-82a | 6 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-377.31 | 6 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit anti-tachykarder Stimulation |
| 5-429.a | 6 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-452.82 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 6-002.j5 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 25,00 mg bis unter 31,25 mg |
| 8-812.50 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.60 | 6 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-83b.c5 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 1-631.0 | 5 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 3-053 | 5 | Endosonographie des Magens |
| 3-100.0 | 5 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-20x | 5 | Andere native Computertomographie |
| 3-703.0 | 5 | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie |
| 3-70d.x | 5 | Teilkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige |
| 5-378.51 | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.52 | 5 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-433.52 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-452.62 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-513.22 | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 8-123.1 | 5 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-144.2 | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-500 | 5 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-641 | 5 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-812.51 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-831.2 | 5 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 1-316.11 | 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |
| 1-426.3 | 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 1-440.7 | 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 1-611.0 | 4 | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt |
| 1-630.0 | 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-661 | 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 3-054 | 4 | Endosonographie des Duodenums |
| 3-607 | 4 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 3-824.x | 4 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige |
| 5-377.6 | 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-429.7 | 4 | Anderer Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 5-469.03 | 4 | Anderer Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.j3 | 4 | Anderer Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-482.11 | 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Endoskopisch |
| 5-513.c | 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-916.a0 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 8-144.0 | 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-812.52 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-837.t | 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen |
| 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-279.0 | < 4 | Anderer diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 1-430.1 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus |
| 1-612 | < 4 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 3-806 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-900 | < 4 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-312.0 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-378.72 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 5-511.11 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 6-002.ja | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 75,00 mg oder mehr |
| 8-020.6 | < 4 | Therapeutische Injektion: Leber |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-152.0 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard |
| 8-154.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-542.12 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-837.m4 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m6 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzen Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83b.b7 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentenfreisetzen Ballons an Koronargefäßen |
| 8-982.3 | < 4 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 9-200.0 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte |
| 1-208.0 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP] |
| 1-266.x | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| 1-273.6 | < 4 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers |
| 1-276.1 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie |
| 1-432.01 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-494.5 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand |
| 1-652.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 1-842 | < 4 | Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese] |
| 1-859.1 | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Pankreas, perkutan |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-703.1 | < 4 | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie |
| 3-722.0 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-803.0 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe |
| 3-826 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 5-012.0 | < 4 | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression |
| 5-013.1 | < 4 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-320.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| 5-345.6 | < 4 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation |
| 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.55 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.5c | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-380.70 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-395.70 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-429.5 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal) |
| 5-451.73 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 6-002.14 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE |
| 6-002.j2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| 6-002.j8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 50,00 mg bis unter 62,50 mg |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-128 | < 4 | Anwendung eines Stuhl drainagesystems |
| 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-190.23 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-542.21 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 8-550.0 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-550.1 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.f0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat |
| 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-837.m5 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 4 Stents in eine Koronararterie |
| 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isolierreinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.7 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-207.1 | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-208.3 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-somatosensorisch [FSSEP] |
| 1-208.7 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Kognitiv [KEP] |
| 1-273.2 | < 4 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens |
| 1-276.0 | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Pulmonalisangiographie |
| 1-276.x | < 4 | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Sonstige |
| 1-430.0 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea |
| 1-432.00 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 1-442.4 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 1-446 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-448.x | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Sonstige |
| 1-464.00 | < 4 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| 1-480.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum |
| 1-490.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf |
| 1-492.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals |
| 1-493.2 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mediastinum |
| 1-494.8 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-494.x | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige |
| 1-502.5 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 1-510.7 | < 4 | Biopsie an intrakraniellm Gewebe durch Inzision und Trepanation von Schädelknochen: Kalotte |
| 1-554 | < 4 | Biopsie am Magen durch Inzision |
| 1-557.1 | < 4 | Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Perirektales Gewebe |
| 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 1-610.x | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige |
| 1-611.x | < 4 | Diagnostische Pharyngoskopie: Sonstige |
| 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-636.0 | < 4 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-791 | < 4 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 3-13a | < 4 | Kolonkontrastuntersuchung |
| 3-13d.0 | < 4 | Urographie: Intravenös |
| 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 3-13g | < 4 | Urethrographie |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-228 | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-603 | < 4 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 3-701 | < 4 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 3-706.1 | < 4 | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |
| 3-70c.1 | < 4 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorselektiven Substanzen |
| 3-722.1 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-724.x | < 4 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige |
| 3-72x | < 4 | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-732.x | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie mit Computertomographie (SPECT/CT) der Lunge: Sonstige |
| 3-753.0 | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-808 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 3-994 | < 4 | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik |
| 5-010.00 | < 4 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte |
| 5-010.2 | < 4 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation |
| 5-013.0 | < 4 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit |
| 5-013.x | < 4 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige |
| 5-015.5 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-021.0 | < 4 | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität |
| 5-029.10 | < 4 | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-031.01 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-032.11 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.21 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.41 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-033.0 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-039.e2 | < 4 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, wiederaufladbar |
| 5-182.2 | < 4 | Resektion der Ohrmuschel: Total |
| 5-270.3 | < 4 | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich |
| 5-273.1 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal |
| 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-377.g1 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär |
| 5-378.05 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.35 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.3x | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-378.5a | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.5d | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.5f | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.5x | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Sonstige |
| 5-378.6a | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.82 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Kupplungskorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.x | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sonstige |
| 5-380.54 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-380.80 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-380.87 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Gefäßprothese |
| 5-381.02 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-392.31 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat mit Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-393.9 | < 4 | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ) |
| 5-394.2 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 5-394.5 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shunt |
| 5-395.02 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-395.x | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-429.1 | < 4 | Anderer Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Sklerosierung von Ösophagusvarizen |
| 5-429.j1 | < 4 | Anderer Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-433.23 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-445.10 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch |
| 5-449.50 | < 4 | Anderer Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-449.s3 | < 4 | Anderer Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-451.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-451.70 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-451.a2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |
| 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-469.c3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch |
| 5-469.s3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-470.1x | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-482.01 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-489.1 | < 4 | Andere Operation am Rektum: Sklerosierung, peranal |
| 5-489.2 | < 4 | Andere Operation am Rektum: Dilatation, peranal |
| 5-489.e | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion |
| 5-490.0 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-491.2 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 5-501.43 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perkutan |
| 5-513.5 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage |
| 5-514.53 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch |
| 5-526.1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-540.1 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-545.0 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-549.2 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum |
| 5-562.5 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-573.40 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 5-780.1k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal |
| 5-790.5f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-800.2g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-831.0 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 5-831.9 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie |
| 5-832.4 | < 4 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell |
| 5-839.61 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-83b.51 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-906.04 | < 4 | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige Teile Kopf |
| 5-909.xx | < 4 | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige |
| 5-921.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 5-984 | < 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 5-985.x | < 4 | Lasertechnik: Sonstige |
| 6-002.13 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE |
| 6-002.j1 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 3,00 mg bis unter 6,25 mg |
| 6-002.j7 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 37,50 mg bis unter 50,00 mg |
| 6-002.p4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg |
| 6-002.p9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg |
| 8-020.c | < 4 | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie |
| 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-100.y | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: N.n.bez. |
| 8-132.x | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-146.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-148.1 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-192.0e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-192.1d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-192.1g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 8-200.6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-542.13 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-779 | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-800.f1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.f5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-812.62 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-836.0e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße |
| 8-837.k3 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-837.k8 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-837.m8 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien |
| 8-83b.06 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Paclitaxel-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 8-83b.b8 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentenfreisetzende Ballons an Koronargefäßen |
| 8-83b.bx | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons |
| 8-854.60 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 8-854.62 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-910 | < 4 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-931.1 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-932 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarterien-druckes |
| 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isolierreinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-200.6 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 9-200.9 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte |

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| AM05 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Abs. 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Schrittmachereingriffe (VC05) ◦ Endoskopische Operationen (VG05) ◦ Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich (VH18) ◦ Interdisziplinäre Tumornachsorge (VH20) ◦ Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) ◦ Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) ◦ Endoskopie (VI35) ◦ Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) ◦ Native Sonographie (VR02) ◦ Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) ◦ Duplexsonographie (VR04) ◦ Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) ◦ Endosonographie (VR06) | |
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01) ◦ Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) ◦ Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07) ◦ Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen (VI08) ◦ Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen (VI09) ◦ Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankun- | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | <p>gen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15) ◦ Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18) ◦ Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19) ◦ Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22) ◦ Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30) ◦ Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31) ◦ Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33) ◦ Endoskopie (VI35) ◦ Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (VI43) ◦ Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) ◦ Native Sonographie (VR02) ◦ Eindimensionale Dopplersonographie (VR03) ◦ Duplexsonographie (VR04) ◦ Sonographie mit Kontrastmittel (VR05) ◦ Endosonographie (VR06) ◦ Computertomographie (CT), nativ (VR10) ◦ Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) ◦ Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) ◦ Szintigraphie (VR18) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) ◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) ◦ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 1-650.2 | 847 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-444.7 | 747 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 5-452.60 | 360 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 1-444.6 | 148 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-452.63 | 86 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 1-650.1 | 65 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-650.0 | 30 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 1-275.2 | 14 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 5-452.62 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-275.0 | 8 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-275.3 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-275.5 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen |
| 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 18,92 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 18,92 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 1,25 | |
| Stationäre Versorgung | 17,67 | |
| Fälle je VK/Person | 280,64516 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|---|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 9,40 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,40 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,75 | |
| Stationäre Versorgung | 8,65 | |
| Fälle je VK/Person | 573,29479 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie | |
| AQ27 | Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie | |
| AQ63 | Allgemeinmedizin | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF25 | Medikamentöse Tumortherapie | |
| ZF27 | Naturheilverfahren | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 71,98 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 71,98 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 2,02 | |
| Stationäre Versorgung | 69,96 | |
| Fälle je VK/Person | 70,88336 | |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,50 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,50 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 0,50 | |
| Fälle je VK/Person | 9918,00000 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|--|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 13,86 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,86 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 3,18 | |
| Stationäre Versorgung | 10,68 | |
| Fälle je VK/Person | 464,32584 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-2.1 Geriatrie

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Geriatrie |
| Fachabteilungsschlüssel | 0200 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|------------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/medizinische-klinik/geriatrie/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dr. med. Arved-Winfried Schneider | Chefarzt Medizinische Klinik | 05631 / 569 - 156 | 05631 / 569 - 342 | innere@krankenhaus-korbach.de |

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|--|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------------|--|--------------------------------|
| VI00 | Geriatrische Behandlung und Therapie | |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | |

B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-2.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 586 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-2.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| R26.3 | 70 | Immobilität |
| I50.1 | 37 | Linksherzinsuffizienz |
| E86 | 35 | Volumenmangel |
| S72.1 | 26 | Pertrochantäre Fraktur |
| J18.8 | 23 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| S72.0 | 21 | Schenkelhalsfraktur |
| I63.8 | 15 | Sonstiger Hirninfarkt |
| N39.0 | 14 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| S32.5 | 14 | Fraktur des Os pubis |
| S42.2 | 11 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| I50.0 | 10 | Rechtsherzinsuffizienz |
| J18.9 | 10 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.1 | 9 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| M16.1 | 9 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| G45.8 | 7 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome |
| I21.4 | 7 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| S06.0 | 7 | Gehirnerschütterung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| H81.2 | 6 | Neuropathia vestibularis |
| R55 | 6 | Synkope und Kollaps |
| S22.0 | 6 | Fraktur eines Brustwirbels |
| S32.0 | 6 | Fraktur eines Lendenwirbels |
| S32.8 | 6 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S72.2 | 6 | Subtrochantäre Fraktur |
| A41.5 | 5 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger |
| A46 | 5 | Erysipel [Wundrose] |
| B99 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| I11.9 | 5 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| J18.2 | 5 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J44.1 | 5 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| M17.1 | 5 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M80.8 | 5 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| S52.5 | 5 | Distale Fraktur des Radius |
| I26.9 | 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| M80.0 | 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| S22.4 | 4 | Rippenserienfraktur |
| S32.1 | 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S42.3 | 4 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S72.3 | 4 | Fraktur des Femurschaftes |
| G30.1 | < 4 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| I10.0 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie |
| I21.1 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I48.2 | < 4 | Vorhofflimmern, permanent |
| I70.2 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| S22.3 | < 4 | Rippenfraktur |
| S82.6 | < 4 | Fraktur des Außenknöchels |
| A09.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| E11.6 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen |
| E11.7 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| G20.1 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung |
| I80.0 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| J18.0 | < 4 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J44.0 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege |
| K29.1 | < 4 | Sonstige akute Gastritis |
| K29.3 | < 4 | Chronische Oberflächengastritis |
| S30.0 | < 4 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.4 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| A04.7 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| A08.1 | < 4 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.1 | < 4 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| C79.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C92.1 | < 4 | Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv |
| D46.9 | < 4 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D50.9 | < 4 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E11.9 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen |
| F01.8 | < 4 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| G20.0 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung |
| G62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| H18.4 | < 4 | Hornhautdegeneration |
| H40.9 | < 4 | Glaukom, nicht näher bezeichnet |
| H66.0 | < 4 | Akute eitrige Otitis media |
| I21.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I25.1 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I35.0 | < 4 | Aortenklappenstenose |
| I44.2 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I49.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I61.1 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I63.0 | < 4 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | < 4 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.5 | < 4 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.9 | < 4 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I80.1 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.2 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I95.1 | < 4 | Orthostatische Hypotonie |
| I95.2 | < 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| K22.1 | < 4 | Ösophagusulkus |
| K22.2 | < 4 | Ösophagusverschluss |
| K26.0 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K29.7 | < 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K40.3 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K52.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K56.3 | < 4 | Gallensteinileus |
| K57.3 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| K74.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| K85.1 | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis |
| L03.1 | < 4 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| M10.0 | < 4 | Idiopathische Gicht |
| M16.0 | < 4 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| M19.0 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke |
| M19.1 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke |
| M23.2 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung |
| M43.1 | < 4 | Spondylolisthese |
| M46.4 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| M47.2 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie |
| M48.0 | < 4 | Spinal(kanal)stenose |
| M48.4 | < 4 | Ermüdungsbruch eines Wirbels |
| M51.1 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M75.4 | < 4 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| M87.8 | < 4 | Sonstige Knochennekrose |
| N17.9 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| N18.5 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| N32.1 | < 4 | Vesikointestinalfistel |
| N32.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N39.4 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R42 | < 4 | Schwindel und Taumel |
| R47.1 | < 4 | Dysarthrie und Anarthrie |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R52.2 | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S12.1 | < 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S27.2 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S70.0 | < 4 | Prellung der Hüfte |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S82.5 | < 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.8 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkels |
| S92.3 | < 4 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| T23.2 | < 4 | Verbrennung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand |
| T84.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |
| T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-771 | 580 | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) |
| 8-550.1 | 539 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 3-200 | 34 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-550.0 | 32 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 9-984.7 | 30 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.b | 18 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-207.0 | 17 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 1-632.0 | 17 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 9-984.8 | 14 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-440.a | 12 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 8-550.2 | 12 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 8-800.c0 | 10 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 1-444.7 | 8 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 8-854.2 | 8 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 1-206 | 7 | Neurographie |
| 8-561.1 | 7 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-930 | 7 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-208.2 | 6 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 9-984.6 | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 3-225 | 5 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-802 | 5 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 8-132.3 | 5 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-133.0 | 5 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 9-200.5 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 9-200.6 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 1-266.0 | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 3-13b | 4 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 3-206 | 4 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-222 | 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 5-572.1 | 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 9-200.02 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 9-984.9 | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 1-205 | < 4 | Elektromyographie (EMG) |
| 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 3-203 | < 4 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-820 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-242 | < 4 | Audiometrie |
| 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 3-052 | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 3-202 | < 4 | Native Computertomographie des Thorax |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-208.8 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-612 | < 4 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-058 | < 4 | Endosonographie des Rektums |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-207 | < 4 | Native Computertomographie des Abdomens |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 3-70c.1 | < 4 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorselektiven Substanzen |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-230.x | < 4 | Zahnextraktion: Sonstige |
| 5-378.07 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 5-378.32 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-820.41 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-146.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-159.2 | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-171.0 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.40 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.00 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-192.0e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-192.1e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-201.g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,75 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,75 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 2,75 | |
| Fälle je VK/Person | 213,09090 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|--|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,75 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,75 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,75 | |
| Fälle je VK/Person | 334,85714 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ63 | Allgemeinmedizin | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF09 | Geriatric | klinische Geriatric im Gebiet Allgemein Medizin |
| ZF27 | Naturheilverfahren | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 13,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,00 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 13,00 | |
| Fälle je VK/Person | 45,07692 | |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,50 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,50 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0 | |
| Stationäre Versorgung | 0,50 | |
| Fälle je VK/Person | 1172,00000 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Anzahl Vollkräfte | 4,20 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,20 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 4,20 | |
| Fälle je VK/Person | 139,52380 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP07 | Geriatric | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-3.1 Allgemein- Viszeral- u. Gefäßchirurgie & Unfallchirurgie u. Orthopädie

| | |
|--|--|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Allgemein- Viszeral- u. Gefäßchirurgie & Unfallchirurgie u. Orthopädie |
| Fachabteilungsschlüssel | 1600 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |
| Weitere Fachabteilungsschlüssel: | o Allgemeine Chirurgie (1500) |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|---------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/chirurgische-klinik/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dr. med. Jochen Klotz | Chefarzt Allgemein-chirurgie, Viszeral- u. Gefäßchirurgie | 05631 / 569 - 172 | 05631 / 569 - 299 | Chirurgie@krankenhaus-korbach.de |
| Dr. med. Arne Fittje | Chefarzt Unfallchirurgie/Orthopädie | 05631 / 569 - 172 | 05631 / 569 - 299 | Chirurgie@krankenhaus-korbach.de |

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| VA16 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | Notfallmäßige und elektive infra-renale Aortenaneurysmata werden durch Bypassverfahren operativ versorgt. |
| VC06 | Defibrillatoreingriffe | Diese werden in enger Absprache und in Kooperation mit der Inneren Medizin im Hause durch die Chirurgie durchgeführt. |
| VC09 | Behandlung von Verletzungen am Herzen | Notfallmäßig werden Verletzungen am Herzen operativ versorgt, die ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine möglich sind. |
| VC11 | Lungenchirurgie | Lungentumore, Dysteletasen, Hämato- und Pneumothoraxe werden auch operativ behandelt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | Bei entsprechender Indikation erfolgt die Thoracotomie zur Versorgung von Lungenparenchymverletzungen; bei persistierendem Pneumothorax erfolgt ggf. die Thoracotomie mit Verschluss der Fistel und Pleurodese. |
| VC14 | Speiseröhrenchirurgie | Divertikeloperationen sowie Tumoroperationen des distalen Speiseröhrenabschnittes werden durchgeführt. |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe | Thorakoskopische Versorgung von Wirbelsäulen-Verletzungen im BWS/LWS-Bereich und im BWS-Bereich. |
| VC17 | Offen chirurgische und endovaskuläre Behandlung von Gefäßerkrankungen | Offene Arterienchirurgie und moderne Bypassverfahren werden an der infrarenalen Aorta, den Blutgefäßen und Arterien der Oberschenkel und den Knies durchgeführt. Ebenso erfolgen die Thrombektomie der Arterien sowie die Anlage von AV-Fisteln zur Dialysebehandlung ohne und mit Kunststoffgefäßersatz. |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen | Neben lokalen Methoden werden Medikamente, Lauftraining und intensive physikalische Behandlungsmethoden eingesetzt. |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | Farbdoppler-Sonografie der Gefäße und Varizenoperationen werden ambulant und stationär genauso durchgeführt wie normalerweise radiologische Gefäßdarstellungen mit Kontrastmittel. |
| VC20 | Nierenchirurgie | Nephrektomien bei Nierentumoren werden ebenso durchgeführt wie die operative Versorgung bei Verletzungen der Niere. |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | Schilddrüsenchirurgie wird umfangreich betrieben, wobei routinemäßig das "Neuromonitoring" zum Einsatz kommt. Nebennierentumore werden ebenfalls operativ entfernt. |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | Magenteilentfernungen, totale Magenresektionen, Fundoplicatiooperationen laparoskopisch bei Zwerchfellhernien und Veränderungen am distalen Oesophagus; Dünndarmteilentfernungen, Dickdarmteilentfernungen, komplette Dickdarmentfernungen werden offen u. laparoskopisch operiert. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------|---|
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | Kleine Tumore und Metastasen der Leber werden operativ und stadiengerecht entfernt. Gallenblasen- und Gallengangchirurgie wird sehr erfahren laparoskopisch (minimal-invasiv) durchgeführt. Pankreaschirurgie wird akut bei Nekrosen und bei Cystenbildungen gemacht. |
| VC24 | Tumorchirurgie | Es wird in enger Zusammenarbeit mit der Onkologie und ggf. in Kooperation mit der Strahlentherapie eine stadiengerechte und leitlinienkonforme Tumorchirurgie, sowohl im viszeralchirurgischen Bereich als auch im orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich, gewährleistet. |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | An allen Extremitäten werden die eingebrachten Osteosynthesen oder auch Fremdkörper unter Schonung der umliegenden Gewebestrukturen entfernt. |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | Bandrekonstruktionen, Plastiken einschließlich gestillte Lappenplastiken werden am Rumpf sowie am Kopf durchgeführt (ebenso Hautersatzplastiken); sämtlicher großer Gelenke: offene sowie transarthroskopische Kapsel-Band-Rekonstruktionen. |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik | Im Bereich des Hüft- wie auch im Bereich des Knie- und Schultergelenkes; bei Knieprothetik sowie der Hüftimplantation per Navigationstechnik; Zugangsweg minimal-invasiv; Wechseloperationen werden regelmäßig durchgeführt; Verwendung hochmoderner Implantate in Zementiertechnik wie auch zementlos. |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | Dekubitalulzera werden vielfach nach modernen Wundkonzepten und durch operative Deckungen und Verschiebelappenplastiken versorgt. |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | Umfassende bildgebende Diagnostik mit Röntgen, CT, Kernspin, Szintigraphie und Schichtaufnahmen wird durchgeführt. Alle Osteosyntheseverfahren intern und extern incl. Ilizarov stehen zur Verfügung. Die Vacuseel-Technik, Segmentresektion und Distraktionsverfahren werden angewandt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | Sämtliche bildgebende Verfahren sind rund um die Uhr möglich;neben umfangreichen konservativen sind auch alle operativen Möglichkeiten am Hause gegeben; moderne Osteosynthesverfahren, plastische Deckungen, Transplantationen von Haut,Gewebe und Knochen. |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | Notfallmäßige Trepanationen bei einem epiduralen Hämatom wird durchgeführt. Die Überwachung der Patienten erfolgt durch Neuromonitoring. |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | Röntgen CT, Angio-CT, Kernspin und Angio-NMR;Organverletzungen sind sowohl durch Oesophaguskopien wie auch Tracheoskopien diagnostizierbar;Mitbehandlung durch Belegärzte HNO möglich;Verletzungen der HWS werden operativ stabilisiert (ventral oder dorsal);Densfrakturen verschraubt |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | Diagnostik: durch Röntgen, CT, Bronchoskopie und Oesophaguskopie können mediastinale Verletzungen ausgeschlossen werden; durch die gut ausgestattete Intensivstation sind Langzeitbeatmung mit Tracheotomie möglich; ggf. sind auch thoraxstabilisierende Eingriffe möglich |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakral- gend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Sämtliche bildgebende Verfahren stehen zur Verfügung; konservative wie operative Versorgung der Frakturen; instabile Wirbelfrakturen werden sowohl dorsal als auch dorsoventral versorgt;Beckenfrakturversorgung durchSchrauben-,Platten- und Fixateurosteosynthesen. |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | Sämtliche bildgebende Verfahren stehen zur Verfügung;sämtliche Frakturformen werden offen wie auch transarthroskopisch versorgt;Kapsel-Band-Rekonstruktionen wie auch Instabilitäten werden offen als auch transarthroskopisch versorgt; kindliche Frakturen werden intramedullär stabilisiert |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | Sämtliche Frakturtypen werden mit modernen Osteosynthesverfahren stabilisiert. Auch kindliche Frakturen werden durch intramedilläre Schienungen versorgt. (Tensnagelung). Kapsel-Band-Rekonstruktionen erfolgen je nach Ausdehnung |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | Sämtliche bildgebende Verfahren stehen zur Verfügung; sämtliche Frakturformen werden offen wie auch transarthroskopisch versorgt; Kapsel-Band-Rekonstruktionen wie auch Instabilitäten werden offen als auch transarthroskopisch versorgt; kindliche Frakturen werden intramedullär stabilisiert |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | Die bildgebende Diagnostik ist umfassend möglich. Es werden sämtliche moderne Verfahren auch in minimal-invasiver Technik bei proximalen Oberschenkelfrakturen durchgeführt, weiterhin erfolgen intern stabilisierende wie auch extern stabilisierende Osteosyntheseverfahren incl. Ilizarov. |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | Sämtliche moderne Osteosyntheseverfahren, incl. minimal-invasiver Technik stehen zur Verfügung. Auch Komplikationen von Frakturen, z. B. Kompartement werden behandelt; Kapsel-Band-Verletzungen werden überwiegend arthroskopisch versorgt jedoch auch offen. |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | Sämtliche bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT, Kernspin und Szintigraphie stehen zur Verfügung. Es werden sämtliche moderne Osteosyntheseverfahren angewandt. |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | Verletzungen am Körperstamm und an den Extremitäten werden nach modernsten medizinischen Techniken und Verfahren standardisiert versorgt. Daneben werden Mehrfachverletzte und polytraumatisierte Patienten qualifiziert und nach standardisierten Prozessabläufen behandelt. |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | Operative Versorgung durch dorsale und ventrale Fusionen mit Fixateur intern und Wirbelkörperersatz (dorsale Fusion: minimal-invasiver Technik; ventrale Fusion thorakoskopisch); Verschraubung von Densfrakturen; Degerative Veränderungen: mit Fixateur, Cages; Infiltrationstherapie und Facettendenergieung. |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven | Nervenverletzungen und Nerventumore werden operativ z. Teil unter Verwendung eines Operationsmikroskops versorgt. Dekompressionsverfahren von peripheren Nerven werden insbesondere Minimal-invasiv durchgeführt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzkrankungen | Interdisziplinäre Behandlung durch definierte Schmerzbehandlungsschemata; physikalische und medikamentöse Behandlung sowie Facetteninfiltrationen oder Foraminainfiltrationen. |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen | Laparoskopische Operationen werden routiniert und standardisiert bei der Hiatushernie, bei der Appendektomie, bei der Leisten- und Nabelhernie sowie bei Dünndarm- und Dickdarmresektionen durchgeführt. |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Es erfolgen arthroskopische Eingriffe sowohl im Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Sprunggelenk. Das Carpaltunnelsyndrom wird überwiegend endoskopisch versorgt. |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | Es erfolgen arthroskopische Eingriffe sowohl im Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Sprunggelenk. Das Carpaltunnelsyndrom wird überwiegend endoskopisch versorgt. |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | An sämtlichen Gelenken können rekonstruktive Eingriffe am Kapsel-Band-Apparat durchgeführt werden, ebenso Beugesehnentransplantationen; im Bereich der Fußchirurgie alle erforderlichen plastischen und rekonstruktiven Eingriffe; bei Weichteildefekten sämtliche Formen der plastischen Deckung. |
| VC58 | Spezialsprechstunde | Es werden Herniesprechstunden sowie eine Gefäßsprechstunden durchgeführt. |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie | |
| VC62 | Portimplantation | |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie | Sämtliche traumatologische Wirbelsäulenverletzungen werden bei Bedarf operativ versorgt mit dorsaler und ventraler Fusion incl. eines Wirbelkörperersatzes, soweit möglich in minimal-invasiver Technik; degenerative Wirbelsäulenveränderungen; komplexe Schmerztherapie; Facettendenerverierung |
| VC66 | Arthroskopische Operationen | Sämtliche arthroskopische Eingriffe incl. Kapselrekonstruktionen werden am Kniegelenk, Sprunggelenk, Schulter und Ellenbogengelenk durchgeführt. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | Die intensivmedizinische Versorgung chirurgischer Patienten erfolgt interdisziplinär unter modernen Behandlungsmethoden, wobei Anästhesie und Chirurgie gemeinsam den Patienten täglich betreuen. Es stehen sämtliche moderne Beatmungsmethoden mit Monitoringverfahren zur Verfügung, incl. Notfalldialyse. |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | Operative sowie konservative Behandlung von deg. bedingten Spondylopathien; ggf. stab. von Listhesen; entzündliche Erkrankungen des Wirbelkörpers oder der Bandscheibe werden konservativ oder durch dorso-ventrale Fusion stabilisiert |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | Erkrankungen der Synovia und Sehnerkrankungen werden arthroskopisch und offen operativ versorgt, wobei auch ausgedehnte konservative Behandlungsverfahren zur Anwendung kommen. |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | Entsprechend der Richtlinien der Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie erfolgt die Diagnostik und Therapie von Osteopathien. Chondropathien werden konservativ wie operativ behandelt, wobei ausgedehnte Knorpelschäden durch Knorpeltransplantationen offen oder arthroskopisch behandelt werden. |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO13 | Spezialsprechstunde | Wir bieten eine Schultersprechstunde, Prothetiksprechstunde sowie Fußsprechstunde. Außerdem eine KV-Sprechstunde und BG-liche Sprechstunde incl. Schwerverletzen-Verfahren. |
| VO14 | Endoprothetik | Zusätzlich zu den Standardprothesen für Hüfte, Knie und Schulter erfolgt die Frakturversorgung durch modulare Prothesen, z.B. der Duokopf-Prothese bzw. Sonderprothesen. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| VO15 | Fußchirurgie | Sämtliche osteosynthetische Versorgung von Frakturen des Mittel- und Vorfußes werden mit internen und externen Verfahren versorgt; Arthrodesen des Sprunggelenkes wie des Mittelfußes werden in minimal-invasiver Technik durchgeführt; operative Versorgung des Hallux valgus. |
| VO16 | Handchirurgie | Sämtliche moderne Osteosyntheseverfahren der Handchirurgie kommen zur Anwendung, auch in mikrochirurgischer Technik; Rekonstruktionen des Sehnen-Band-Apparates; Dupuytren'sche Kontraktionen, schnellende Finger, Ganglien, Ritzarthrosen, Arthrosen des Handgelenkes; Karpaltunnelsyndrome |
| VO17 | Rheumachirurgie | |
| VO19 | Schulterchirurgie | Sämtliche akuten wie auch degenerativen Erkrankungen des Schultergelenkes werden durchgeführt sowohl arthroskopisch als auch offen; so auch Kapsel-Band-Rekonstruktionen. Das Impingementsyndrom des Schultergelenkes wird arthroskopisch behandelt; Omarthrosen werden prothetisch versorgt. |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VZ00 | Stoßwellentherapie | Einkammersysteme und Zweikammersysteme werden je nach Indikation eingesetzt. Wechseloperationen und Defibrillatoreingriffe werden ebenso routiniert operiert. |
| VZ14 | Operationen an Kiefer- und Gesichtsschädelknochen | |

B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-3.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 3064 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-3.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| S06.0 | 247 | Gehirnerschütterung |
| M54.1 | 99 | Radikulopathie |
| M48.0 | 91 | Spinal(kanal)stenose |
| M51.1 | 91 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| K40.9 | 76 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| M47.2 | 59 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie |
| I70.2 | 58 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| S52.5 | 56 | Distale Fraktur des Radius |
| M43.1 | 49 | Spondylolisthesis |
| M17.1 | 48 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M54.4 | 44 | Lumboischialgie |
| K80.1 | 43 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| E11.7 | 40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen |
| S30.0 | 38 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S42.2 | 38 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus |
| S32.0 | 37 | Fraktur eines Lendenwirbels |
| S72.0 | 35 | Schenkelhalsfraktur |
| K35.8 | 32 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| N18.5 | 31 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| R10.3 | 30 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| K57.3 | 28 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| M16.1 | 27 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| I83.9 | 26 | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung |
| K59.0 | 25 | Obstipation |
| S82.6 | 25 | Fraktur des Außenknöchels |
| K35.3 | 24 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis |
| A46 | 23 | Erysipel [Wundrose] |
| S72.1 | 23 | Pertrochantäre Fraktur |
| K80.0 | 22 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |
| M47.8 | 22 | Sonstige Spondylose |
| M75.4 | 22 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| M23.2 | 21 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung |
| M54.5 | 21 | Kreuzschmerz |
| L05.0 | 20 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| M42.1 | 20 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen |
| M54.2 | 19 | Zervikalneuralgie |
| S13.4 | 19 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S22.0 | 19 | Fraktur eines Brustwirbels |
| M51.2 | 18 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| R52.1 | 18 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz |
| T84.0 | 18 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese |
| I80.8 | 17 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| K40.2 | 17 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| S42.0 | 17 | Fraktur der Klavikula |
| A09.9 | 16 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| K56.4 | 16 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K61.0 | 16 | Analabszess |
| N20.0 | 16 | Nierenstein |
| S82.1 | 16 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia |
| K40.3 | 15 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| M50.1 | 15 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| S22.4 | 15 | Rippenserienfraktur |
| S82.8 | 15 | Frakturen sonstiger Teile der Unterschenkel |
| T82.8 | 15 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| L02.4 | 13 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| S20.2 | 13 | Prellung des Thorax |
| S82.2 | 12 | Fraktur des Tibiaschaftes |
| S83.5 | 12 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes |
| T82.5 | 12 | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen |
| L02.2 | 11 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| L03.1 | 11 | Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten |
| M75.1 | 11 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| S52.6 | 11 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| I87.2 | 10 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) |
| M20.1 | 10 | Hallux valgus (erworben) |
| M23.3 | 10 | Sonstige Meniskusschädigungen |
| M80.0 | 10 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| M84.1 | 10 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose] |
| S62.3 | 10 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens |
| S86.0 | 10 | Verletzung der Achillessehne |
| T81.4 | 10 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.4 | 10 | Mechanische Komplikation durch Gefäßkatheter bei Dialyse |
| E04.1 | 9 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| K40.0 | 9 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.0 | 9 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| M19.0 | 9 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke |
| M23.5 | 9 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes |
| S43.0 | 9 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk] |
| C18.7 | 8 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| K29.1 | 8 | Sonstige akute Gastritis |
| K42.9 | 8 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.9 | 8 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K80.2 | 8 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |
| L03.0 | 8 | Phlegmone an Fingern und Zehen |
| M53.1 | 8 | Zervikobrachial-Syndrom |
| M80.8 | 8 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur |
| S76.1 | 8 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S92.3 | 8 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| K36 | 7 | Sonstige Appendizitis |
| K43.2 | 7 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.5 | 7 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| K64.2 | 7 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| M50.2 | 7 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M96.1 | 7 | Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert |
| N39.0 | 7 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| S30.1 | 7 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.4 | 7 | Fraktur des Acetabulums |
| S52.3 | 7 | Fraktur des Radiuschaftes |
| S80.0 | 7 | Prellung des Knies |
| T82.3 | 7 | Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate |
| A09.0 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| C20 | 6 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C79.5 | 6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| I74.3 | 6 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| K42.0 | 6 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S02.4 | 6 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S06.5 | 6 | Traumatische subdurale Blutung |
| S22.3 | 6 | Rippenfraktur |
| S27.3 | 6 | Sonstige Verletzungen der Lunge |
| S32.8 | 6 | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S42.1 | 6 | Fraktur der Skapula |
| S42.4 | 6 | Fraktur des distalen Endes des Humerus |
| S43.1 | 6 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S52.1 | 6 | Fraktur des proximalen Endes des Radius |
| S52.4 | 6 | Fraktur des Ulna- und Radiusschaftes, kombiniert |
| T81.8 | 6 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T82.7 | 6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| D17.2 | 5 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| E04.0 | 5 | Nichttoxische diffuse Struma |
| E04.2 | 5 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| G56.0 | 5 | Karpaltunnel-Syndrom |
| I65.2 | 5 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| K35.2 | 5 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| K63.1 | 5 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| L89.3 | 5 | Dekubitus 4. Grades |
| L98.4 | 5 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| M16.0 | 5 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M47.1 | 5 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie |
| M71.2 | 5 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| M75.3 | 5 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| N10 | 5 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| S02.6 | 5 | Unterkieferfraktur |
| S32.1 | 5 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.5 | 5 | Fraktur des Os pubis |
| S42.3 | 5 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S52.0 | 5 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna |
| S52.8 | 5 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S70.0 | 5 | Prellung der Hüfte |
| S72.3 | 5 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.4 | 5 | Distale Fraktur des Femurs |
| S82.0 | 5 | Fraktur der Patella |
| S82.3 | 5 | Distale Fraktur der Tibia |
| S92.0 | 5 | Fraktur des Kalkaneus |
| T81.0 | 5 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| I80.2 | 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I83.0 | 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration |
| K43.9 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.6 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| M25.5 | 4 | Gelenkschmerz |
| M53.2 | 4 | Instabilität der Wirbelsäule |
| M70.6 | 4 | Bursitis trochanterica |
| M79.6 | 4 | Schmerzen in den Extremitäten |
| S00.0 | 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| S12.2 | 4 | Fraktur eines sonstigen näher bezeichneten Halswirbels |
| S27.0 | 4 | Traumatischer Pneumothorax |
| S46.2 | 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S52.2 | 4 | Fraktur des Ulnaschaftes |
| S80.8 | 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels |
| S83.2 | 4 | Meniskusriss, akut |
| T84.2 | 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen |
| T85.0 | 4 | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt |
| T85.1 | 4 | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C25.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| E86 | < 4 | Volumenmangel |
| K25.1 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K61.2 | < 4 | Anorektalabszess |
| L02.3 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| L05.9 | < 4 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| L89.2 | < 4 | Dekubitus 3. Grades |
| M19.2 | < 4 | Sonstige sekundäre Arthrose |
| M53.3 | < 4 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| M54.8 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen |
| M84.4 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| M86.1 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis |
| S01.0 | < 4 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S02.2 | < 4 | Nasenbeinfraktur |
| S06.2 | < 4 | Diffuse Hirnverletzung |
| S22.2 | < 4 | Fraktur des Sternums |
| S66.1 | < 4 | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S83.0 | < 4 | Luxation der Patella |
| T24.2 | < 4 | Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß |
| T84.4 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| C16.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.6 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C61 | < 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C82.1 | < 4 | Follikuläres Lymphom Grad II |
| C90.0 | < 4 | Multiples Myelom |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D17.1 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| G58.0 | < 4 | Interkostalneuropathie |
| I10.0 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I50.0 | < 4 | Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.1 | < 4 | Linksherzinsuffizienz |
| I63.3 | < 4 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| K13.0 | < 4 | Krankheiten der Lippen |
| K25.3 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.1 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| K43.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K56.2 | < 4 | Volvulus |
| K57.1 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K57.2 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| K60.3 | < 4 | Analfistel |
| K63.2 | < 4 | Darmfistel |
| K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |
| L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| L72.1 | < 4 | Trichilemmalzyste |
| M10.0 | < 4 | Idiopathische Gicht |
| M16.3 | < 4 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M46.4 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet |
| M48.4 | < 4 | Ermüdungsbruch eines Wirbels |
| M60.0 | < 4 | Infektiöse Myositis |
| M65.8 | < 4 | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis |
| M67.4 | < 4 | Ganglion |
| M67.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen |
| M70.2 | < 4 | Bursitis olecrani |
| M70.4 | < 4 | Bursitis praepatellaris |
| M77.4 | < 4 | Metatarsalgie |
| M79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes |
| M87.2 | < 4 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma |
| M94.2 | < 4 | Chondromalazie |
| N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N61 | < 4 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| R50.8 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| S06.6 | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S12.1 | < 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S36.1 | < 4 | Verletzung der Leber oder der Gallenblase |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S46.0 | < 4 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| S50.0 | < 4 | Prellung des Ellenbogens |
| S62.2 | < 4 | Fraktur des 1. Mittelhandknochens |
| S62.6 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers |
| S66.0 | < 4 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S73.0 | < 4 | Luxation der Hüfte |
| S76.2 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S81.0 | < 4 | Offene Wunde des Knies |
| S82.4 | < 4 | Fraktur der Fibula, isoliert |
| S82.5 | < 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| S82.7 | < 4 | Multiple Frakturen des Unterschenkels |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| S83.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes mit Beteiligung des (fibularen) (tibialen) Seitenbandes |
| S93.2 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| T84.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen |
| T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T84.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| T84.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T85.6 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| A04.7 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile |
| A28.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert |
| C10.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C21.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C44.4 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| C53.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C67.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C78.4 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C78.7 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C79.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| D05.1 | < 4 | Carcinoma in situ der Milchgänge |
| D16.6 | < 4 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| D17.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D17.5 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intraabdominalen Organe |
| D28.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Tubae uterinae und Ligamenta |
| D34 | < 4 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| D41.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Niere |
| D43.4 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Rückenmark |
| D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| E06.5 | < 4 | Sonstige chronische Thyreoiditis |
| F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| G37.3 | < 4 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G57.3 | < 4 | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis |
| G58.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien |
| G83.4 | < 4 | Cauda- (equina-) Syndrom |
| G95.0 | < 4 | Syringomyelie und Syringobulbie |
| G97.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen |
| H61.0 | < 4 | Perichondritis des äußeren Ohres |
| I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I49.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I60.8 | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I61.4 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I62.0 | < 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch) |
| I71.3 | < 4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I73.0 | < 4 | Raynaud-Syndrom |
| I74.0 | < 4 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis |
| I74.2 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten |
| I77.1 | < 4 | Arterienstriktur |
| I80.0 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| I83.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |
| I86.8 | < 4 | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| I88.8 | < 4 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis |
| I89.0 | < 4 | Lymphödem, anderenorts nicht klassifiziert |
| I89.1 | < 4 | Lymphangitis |
| J41.1 | < 4 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| J93.0 | < 4 | Spontaner Spannungspneumothorax |
| K12.2 | < 4 | Phlegmone und Abszess des Mundes |
| K22.1 | < 4 | Ösophagusulkus |
| K26.3 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K31.5 | < 4 | Duodenalverschluss |
| K40.4 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän |
| K41.3 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.5 | < 4 | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K45.1 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abdominale Hernien mit Gangrän |
| K52.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K56.7 | < 4 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K57.4 | < 4 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess |
| K60.5 | < 4 | Anorektalfistel |
| K61.1 | < 4 | Rektalabszess |
| K61.4 | < 4 | Intrasphinktäerer Abszess |
| K62.2 | < 4 | Analprolaps |
| K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| K63.0 | < 4 | Darmabszess |
| K63.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.4 | < 4 | Marisken als Folgezustand von Hämorrhoiden |
| K65.0 | < 4 | Akute Peritonitis |
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K80.3 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis |
| K80.4 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| K81.1 | < 4 | Chronische Cholezystitis |
| K82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase |
| K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| K85.9 | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet |
| K91.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L02.8 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| L23.5 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige chemische Produkte |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| L27.1 | < 4 | Lokalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L30.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |
| M00.0 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken |
| M00.9 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| M10.4 | < 4 | Sonstige sekundäre Gicht |
| M12.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert |
| M13.1 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M13.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthritis |
| M19.1 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke |
| M20.2 | < 4 | Hallux rigidus |
| M20.4 | < 4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) |
| M21.1 | < 4 | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert |
| M22.4 | < 4 | Chondromalacia patellae |
| M23.4 | < 4 | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk |
| M24.0 | < 4 | Freier Gelenkkörper |
| M24.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert |
| M25.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten |
| M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| M46.1 | < 4 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M50.0 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie |
| M51.3 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibendegeneration |
| M54.6 | < 4 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M65.1 | < 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis |
| M70.5 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| M70.7 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich der Hüfte |
| M71.0 | < 4 | Schleimbeutelabszess |
| M76.3 | < 4 | Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom [Iliotibial band syndrome] |
| M76.8 | < 4 | Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes |
| M77.3 | < 4 | Kalkaneussporn |
| M79.5 | < 4 | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe |
| M81.8 | < 4 | Sonstige Osteoporose |
| M84.2 | < 4 | Verzögerte Frakturheilung |
| M85.6 | < 4 | Sonstige Knochenzyste |
| M86.0 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis |
| M86.4 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel |
| M86.8 | < 4 | Sonstige Osteomyelitis |
| M89.0 | < 4 | Neurodystrophie [Algodystrophie] |
| M89.5 | < 4 | Osteolyse |
| M89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten |
| M93.2 | < 4 | Osteochondrosis dissecans |
| N17.9 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet |
| N32.1 | < 4 | Vesikointestinalfistel |
| N32.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N43.2 | < 4 | Sonstige Hydrozele |
| N73.6 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N82.3 | < 4 | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm |
| N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| Q43.0 | < 4 | Meckel-Divertikel |
| Q82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut |
| R02 | < 4 | Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert |
| R06.0 | < 4 | Dyspnoe |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R10.1 | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R10.2 | < 4 | Schmerzen im Becken und am Damm |
| R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| R18 | < 4 | Aszites |
| R19.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen |
| R26.3 | < 4 | Immobilität |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R52.0 | < 4 | Akuter Schmerz |
| R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| S00.8 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes |
| S01.8 | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S02.0 | < 4 | Schädeldachfraktur |
| S02.3 | < 4 | Fraktur des Orbitabodens |
| S06.1 | < 4 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.4 | < 4 | Epidurale Blutung |
| S08.0 | < 4 | Skalpierungsverletzung |
| S10.8 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses |
| S14.2 | < 4 | Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| S14.3 | < 4 | Verletzung des Plexus brachialis |
| S22.1 | < 4 | Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| S27.2 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| S31.1 | < 4 | Offene Wunde der Bauchdecke |
| S32.3 | < 4 | Fraktur des Os ilium |
| S36.0 | < 4 | Verletzung der Milz |
| S36.4 | < 4 | Verletzung des Dünndarmes |
| S36.5 | < 4 | Verletzung des Dickdarmes |
| S41.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberarmes |
| S43.5 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| S51.0 | < 4 | Offene Wunde des Ellenbogens |
| S51.7 | < 4 | Multiple offene Wunden des Unterarmes |
| S51.8 | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S53.1 | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Ellenbogens |
| S60.0 | < 4 | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.0 | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.7 | < 4 | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand |
| S62.0 | < 4 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand |
| S62.4 | < 4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S62.5 | < 4 | Fraktur des Daumens |
| S64.4 | < 4 | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger |
| S66.3 | < 4 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.4 | < 4 | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.6 | < 4 | Verletzung mehrerer Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S68.0 | < 4 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) |
| S68.2 | < 4 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) |
| S71.1 | < 4 | Offene Wunde des Oberschenkels |
| S72.9 | < 4 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S76.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte |
| S83.6 | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| S86.1 | < 4 | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S93.0 | < 4 | Luxation des oberen Sprunggelenkes |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| S93.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes |
| S96.1 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Streckmuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| T21.8 | < 4 | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes |
| T22.8 | < 4 | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand |
| T75.4 | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| T79.8 | < 4 | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.7 | < 4 | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T88.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z04.1 | < 4 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall |

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-561.1 | 1509 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-930 | 568 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 3-200 | 409 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-996 | 278 | Anwendung eines 3D-Bildwandlers |
| 5-984 | 265 | Mikrochirurgische Technik |
| 3-203 | 262 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-802 | 254 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 8-914.12 | 185 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-831.0 | 179 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 5-931.0 | 158 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 3-225 | 157 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-800.c0 | 150 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-033.0 | 144 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-916.a0 | 140 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-832.4 | 130 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell |
| 5-83a.2 | 129 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodeneration des Iliosakralgelenkes |
| 5-831.0 | 125 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 3-205 | 118 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 9-984.7 | 116 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3-206 | 104 | Native Computertomographie des Beckens |
| 8-914.1x | 104 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 5-032.00 | 99 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-032.20 | 93 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.10 | 92 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment |
| 3-222 | 91 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-900.04 | 80 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-932.1 | 80 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material |
| 5-83a.02 | 79 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente |
| 5-869.2 | 76 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Osteosynthesematerial bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 5-530.31 | 71 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 9-984.8 | 71 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 5-511.11 | 69 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 3-823 | 68 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-83a.01 | 64 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 2 Segmente |
| 3-207 | 60 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 8-020.5 | 60 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |
| 5-932.00 | 59 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung |
| 5-839.60 | 58 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 5-839.61 | 56 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 8-910 | 55 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-931.0 | 50 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-032.01 | 49 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-83b.70 | 49 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 5-399.5 | 47 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-572.1 | 47 | Zystostomie: Perkutan |
| 1-632.0 | 46 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 5-032.11 | 46 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-83w.0 | 45 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers |
| 5-916.a1 | 45 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 5-394.5 | 44 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-831.9 | 44 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie |
| 5-83b.71 | 44 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 3-900 | 42 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 5-783.2x | 42 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Sonstige |
| 8-812.60 | 42 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-810.0h | 41 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-830.0 | 41 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement |
| 8-803.2 | 41 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-190.20 | 40 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-701 | 40 | Einfache endotracheale Intubation |
| 5-83b.51 | 39 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 8-854.2 | 38 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 5-790.5f | 37 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 3-806 | 36 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-794.k6 | 36 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-812.5 | 36 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 1-207.0 | 35 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 5-470.11 | 35 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-032.02 | 34 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.21 | 33 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 8-917.13 | 33 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 1-208.2 | 32 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 9-984.9 | 32 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 1-440.a | 31 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-697.1 | 31 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 5-030.71 | 31 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente |
| 3-607 | 30 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 3-828 | 30 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 5-839.g0 | 30 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Verschluss eines Bandscheibendefektes (Anulus) mit Implantat: 1 Segment |
| 5-83b.31 | 30 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-820.41 | 29 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-836.31 | 29 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 5-835.9 | 28 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-836.51 | 28 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-896.1g | 28 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-820.00 | 27 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.j1 | 27 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-835.b0 | 27 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen |
| 5-83b.53 | 27 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.0 | 26 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-831.5 | 26 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 5-83b.52 | 25 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 8-192.1g | 25 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 1-697.7 | 24 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 3-202 | 24 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-032.40 | 24 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-811.2h | 24 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 8-176.2 | 24 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-191.5 | 24 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-914.10 | 24 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-915 | 24 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 1-694 | 23 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 3-223 | 23 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-059.83 | 23 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden |
| 5-810.00 | 23 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-812.eh | 23 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-836.30 | 23 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-836.32 | 23 | Spondylodese: Dorsal: 3 bis 5 Segmente |
| 5-83a.00 | 23 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 1 Segment |
| 5-83b.50 | 23 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-865.7 | 23 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-897.0 | 23 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 5-988 | 23 | Anwendung eines Navigationssystems |
| 8-706 | 23 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-469.20 | 22 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch |
| 5-896.1e | 22 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-030.70 | 21 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment |
| 5-032.41 | 21 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-380.70 | 21 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-832.6 | 21 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkofforaminektomie |
| 8-190.21 | 21 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-192.1b | 21 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 3-82a | 20 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-469.21 | 20 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-794.2r | 20 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 8-836.0c | 20 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterschenkel |
| 3-220 | 19 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-392.10 | 19 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntens: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Ohne Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-800.3g | 19 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-822.g1 | 19 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-831.7 | 19 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv |
| 5-839.a0 | 19 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 8-144.0 | 19 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-800.c1 | 19 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-812.50 | 19 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 1-273.6 | 18 | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers |
| 1-279.0 | 18 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Bestimmung des Herzvolumens und der Austreibungsfraktion |
| 1-444.7 | 18 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 5-069.40 | 18 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-385.96 | 18 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-896.1d | 18 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-896.1f | 18 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-192.0b | 18 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion |
| 1-650.2 | 17 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 5-785.3x | 17 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Sonstige |
| 5-832.5 | 17 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total |
| 8-831.2 | 17 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 5-031.02 | 16 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-385.70 | 16 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5-805.6 | 16 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale |
| 5-811.1h | 16 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-814.3 | 16 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-98c.2 | 16 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 1-206 | 15 | Neurographie |
| 3-600 | 15 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 5-470.1x | 15 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-793.3r | 15 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-820.02 | 15 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-831.2 | 15 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression |
| 5-83b.30 | 15 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment |
| 5-83b.32 | 15 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-896.0g | 15 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 1-205 | 14 | Elektromyographie (EMG) |
| 3-820 | 14 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-395.70 | 14 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-785.2x | 14 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Sonstige |
| 5-811.20 | 14 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-813.4 | 14 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-836.50 | 14 | Spondylodese: Ventral: 1 Segment |
| 5-896.1a | 14 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-132.3 | 14 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-190.22 | 14 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-200.6 | 14 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 8-812.51 | 14 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 3-805 | 13 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 5-030.72 | 13 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente |
| 5-534.03 | 13 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-784.8x | 13 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene: Sonstige |
| 5-805.7 | 13 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 1-620.01 | 12 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 5-385.2 | 12 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Lokale Exzision |
| 5-465.1 | 12 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-530.32 | 12 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-530.33 | 12 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-782.b0 | 12 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula |
| 5-790.28 | 12 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-794.0n | 12 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-811.0h | 12 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-836.53 | 12 | Spondylodese: Ventral: 3 bis 5 Segmente |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-83b.72 | 12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-896.1b | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 9-984.6 | 12 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 1-610.0 | 11 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 3-226 | 11 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-061.0 | 11 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-063.0 | 11 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-469.00 | 11 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 5-530.34 | 11 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-783.0x | 11 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige |
| 5-793.k6 | 11 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-794.0r | 11 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-794.26 | 11 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-800.60 | 11 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidalgelenk |
| 5-820.01 | 11 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-832.0 | 11 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt |
| 5-839.62 | 11 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 5-916.a3 | 11 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 8-192.0e | 11 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-771 | 11 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-83b.70 | 11 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme |
| 8-919 | 11 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 1-266.0 | 10 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-654.1 | 10 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-013.1 | 10 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms |
| 5-032.12 | 10 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-036.8 | 10 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik |
| 5-380.72 | 10 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-380.a1 | 10 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-381.70 | 10 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-399.7 | 10 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-536.41 | 10 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-786.0 | 10 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-788.00 | 10 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-793.1r | 10 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-855.19 | 10 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-869.1 | 10 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 5-930.4 | 10 | Art des Transplantates: Alloplastisch |
| 8-190.23 | 10 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-522.d1 | 10 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-836.02 | 10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.0s | 10 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Arterien Oberschenkel |
| 1-651 | 9 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 3-606 | 9 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 3-613 | 9 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-825 | 9 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-010.2 | 9 | Schädelöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation |
| 5-340.0 | 9 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 5-380.54 | 9 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-470.10 | 9 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 5-490.0 | 9 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-541.3 | 9 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-782.a0 | 9 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula |
| 5-787.31 | 9 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal |
| 5-790.25 | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 5-831.6 | 9 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv |
| 5-900.0e | 9 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-98c.0 | 9 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 5-98c.1 | 9 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-201.g | 9 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-210 | 9 | Brisement force |
| 8-812.52 | 9 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 1-204.2 | 8 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 3-130 | 8 | Myelographie |
| 5-393.54 | 8 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, unterhalb des Kniegelenkes |
| 5-448.42 | 8 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-455.05 | 8 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.41 | 8 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.10 | 8 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.11 | 8 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-490.1 | 8 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-493.5 | 8 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Mit Stapler |
| 5-784.2x | 8 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Sonstige |
| 5-800.1h | 8 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-805.a | 8 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Implantat |
| 5-822.81 | 8 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert |
| 5-859.11 | 8 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla |
| 5-900.09 | 8 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 8-932 | 8 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarterien-druckes |
| 8-987.10 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 9-320 | 8 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 3-13b | 7 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 5-030.x | 7 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Sonstige |
| 5-032.7 | 7 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral |
| 5-455.01 | 7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-783.0d | 7 | Entnahme eines Knochen transplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-784.1x | 7 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Sonstige |
| 5-793.36 | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-794.21 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 5-794.k1 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-796.20 | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-804.0 | 7 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral |
| 5-855.18 | 7 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen scheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.0e | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.0b | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-900.1a | 7 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 8-144.2 | 7 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-192.0a | 7 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 1-650.0 | 6 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 3-800 | 6 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-826 | 6 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 5-031.01 | 6 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-056.40 | 6 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-059.c1 | 6 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulations-elektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-059.d2 | 6 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, wiederaufladbar |
| 5-380.80 | 6 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-385.72 | 6 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva |
| 5-385.82 | 6 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 5-395.a1 | 6 | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-395.a2 | 6 | Patchplastik an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-452.60 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-462.1 | 6 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma |
| 5-534.33 | 6 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-541.0 | 6 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-541.2 | 6 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 5-545.0 | 6 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-780.60 | 6 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula |
| 5-787.1n | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.36 | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 5-788.60 | 6 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-790.1b | 6 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-794.kk | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-801.40 | 6 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-806.3 | 6 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-812.7 | 6 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-829.h | 6 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-838.95 | 6 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-839.a1 | 6 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-859.12 | 6 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-859.18 | 6 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.09 | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-896.17 | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.1b | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-900.1e | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 8-128 | 6 | Anwendung eines Stuhldrainagesystems |
| 8-192.0g | 6 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-83b.0c | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentenfreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 8-914.11 | 6 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 9-200.01 | 6 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 1-650.1 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-854.7 | 5 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 3-052 | 5 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 3-80x | 5 | Andere native Magnetresonanztomographie |
| 3-82x | 5 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel |
| 5-021.0 | 5 | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität |
| 5-032.22 | 5 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-069.41 | 5 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM] |
| 5-311.1 | 5 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-380.53 | 5 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis |
| 5-380.a2 | 5 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-383.a2 | 5 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-393.53 | 5 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femoropopliteal, oberhalb des Kniegelenkes |
| 5-471.11 | 5 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-534.31 | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-542.0 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-543.20 | 5 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-783.01 | 5 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus proximal |
| 5-788.5e | 5 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie |
| 5-790.16 | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.4m | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-793.1n | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-794.16 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-794.1f | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.af | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-79b.11 | 5 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.c1 | 5 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Akromioklavikulargelenk |
| 5-805.x | 5 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige |
| 5-810.91 | 5 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Akromioklavikulargelenk |
| 5-820.94 | 5 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-824.01 | 5 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese |
| 5-829.9 | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-829.k | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz |
| 5-832.1 | 5 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-837.00 | 5 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.10 | 5 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibendoprothese: 1 Segment |
| 5-841.11 | 5 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-865.6 | 5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 5-892.0b | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0f | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-896.0f | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-896.18 | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| 5-900.0f | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 5-900.1x | 5 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige |
| 5-932.01 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit antimikrobieller Beschichtung |
| 8-192.0c | 5 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-201.0 | 5 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk |
| 8-527.8 | 5 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 8-528.6 | 5 | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung |
| 8-529.8 | 5 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-800.c3 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-914.02 | 5 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-917.11 | 5 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 9-200.02 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 9-984.a | 5 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 9-984.b | 5 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-208.8 | 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 1-242 | 4 | Audiometrie |
| 1-266.1 | 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) |
| 1-275.0 | 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen |
| 1-620.00 | 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-710 | 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 3-20x | 4 | Andere native Computertomographie |
| 3-808 | 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 5-020.2 | 4 | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück) |
| 5-022.00 | 4 | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär |
| 5-031.00 | 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-059.c2 | 4 | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulations-elektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, wiederaufladbar |
| 5-380.84 | 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-383.a1 | 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-385.4 | 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-399.6 | 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-448.22 | 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch |
| 5-451.1 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 5-467.02 | 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-484.31 | 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-491.2 | 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 5-511.41 | 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-530.71 | 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-534.x | 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige |
| 5-536.0 | 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss |
| 5-549.5 | 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-780.6k | 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal |
| 5-784.0d | 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Becken |
| 5-786.2 | 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 5-787.30 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-787.3r | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-790.0d | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| 5-790.41 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-790.42 | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-793.kr | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-794.kh | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-800.4h | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-800.9h | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Kniegelenk |
| 5-801.01 | 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk |
| 5-802.6 | 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-811.2k | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-814.c | 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Einbringen eines Abstandhalters |
| 5-824.20 | 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers) |
| 5-830.1 | 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie |
| 5-859.28 | 4 | Anderer Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-864.9 | 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-892.08 | 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm |
| 5-892.0d | 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.17 | 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.1c | 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.0g | 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-896.08 | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm |
| 5-896.09 | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 5-916.a5 | 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 8-192.08 | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm |
| 8-192.1f | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-192.3g | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-800.g2 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.j4 | 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-83b.71 | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme |
| 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-503.4 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule |
| 1-632.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 5-010.10 | < 4 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte |
| 5-012.0 | < 4 | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression |
| 5-031.5 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural |
| 5-032.8 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal |
| 5-032.b | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert thorako-retroperitoneal |
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-059.1 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems |
| 5-059.g1 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-380.71 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-381.02 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-385.5 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoskopische Diszision der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-385.74 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: Vv. saphenae magna et parva |
| 5-385.d0 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossektomie: V. saphena magna |
| 5-392.30 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel mit alloplastischem Material: Mit Implantat ohne Abstrom in den rechten Vorhof |
| 5-393.9 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Temporärer arterio-arterieller Shunt (intraoperativ) |
| 5-394.2 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision eines vaskulären Implantates |
| 5-395.12 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-395.71 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-455.61 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-535.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-536.47 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-611 | < 4 | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-780.6f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-783.0f | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal |
| 5-784.01 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Humerus proximal |
| 5-784.0v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Metatarsale |
| 5-784.0x | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Sonstige |
| 5-784.7d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen: Becken |
| 5-785.26 | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Radius distal |
| 5-786.k | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 5-786.x | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Sonstige |
| 5-787.1r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-787.6m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-788.52 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.5c | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal |
| 5-788.5d | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, proximal |
| 5-790.0n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-790.19 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-790.3f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.51 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-792.1g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-793.1k | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-793.2f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-794.4f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.kr | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-796.k0 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-810.6h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk |
| 5-812.fh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-812.kk | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk |
| 5-819.x1 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk |
| 5-820.50 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |
| 5-821.40 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-824.21 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-825.k1 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerus-teil |
| 5-831.3 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe |
| 5-838.a5 | < 4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Ventral instrumentierte Korrekturspondylodese: Primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-839.5 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-850.b6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion |
| 5-850.b8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.02 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-864.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel |
| 5-892.06 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.18 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm |
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.1e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.07 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.0c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.1c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.18 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm |
| 5-900.1d | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß |
| 5-902.4f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 8-115.5 | < 4 | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, untere Extremität |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-144.1 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-176.1 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| 8-192.0f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-840.0s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzen Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel |
| 8-854.60 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 9-200.1 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 9-200.7 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-652.1 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-697.8 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk |
| 3-13d.0 | < 4 | Urographie: Intravenös |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-228 | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-70c.x | < 4 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige |
| 5-010.00 | < 4 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte |
| 5-012.2 | < 4 | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms |
| 5-024.2 | < 4 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters |
| 5-030.32 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.11 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 2 Segmente |
| 5-031.31 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente |
| 5-031.x | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Sonstige |
| 5-032.42 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.6 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal |
| 5-032.a | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Kombiniert pararektal-retroperitoneal |
| 5-033.2 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms |
| 5-035.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute, Tumorgewebe |
| 5-039.34 | < 4 | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-056.8 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein |
| 5-343.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-377.1 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.07 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder |
| 5-380.73 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: Gefäßprothese |
| 5-380.83 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-386.a2 | < 4 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-388.70 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-388.9x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige |
| 5-393.36 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortofemoral |
| 5-393.8 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Venös |
| 5-394.1 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Revision einer Anastomose |
| 5-394.4 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Entfernung eines vaskulären Implantates |
| 5-394.6 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Verschluss eines arteriovenösen Shuntes |
| 5-395.02 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-450.1 | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum |
| 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.21 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-466.2 | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-467.01 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-471.0 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-484.02 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Manschettenresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-491.10 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan |
| 5-509.x | < 4 | Andere Operationen an der Leber: Sonstige |
| 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.21 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-530.0x | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.74 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-534.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-535.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Onlay-Technik |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-536.45 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-538.41 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch |
| 5-538.a | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material |
| 5-540.0 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Exploration |
| 5-540.1 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| 5-764.13 | < 4 | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-779.3 | < 4 | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial |
| 5-784.0t | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Kalkaneus |
| 5-786.5 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente |
| 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-787.0b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-787.0j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.10 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula |
| 5-787.11 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal |
| 5-787.1h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft |
| 5-787.2g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-787.5e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-787.7f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.xk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-788.6x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Sonstige |
| 5-789.xw | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Phalangen Fuß |
| 5-790.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-790.2b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.2v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale |
| 5-790.3m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.5h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur distal |
| 5-790.5m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft |
| 5-793.23 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-793.27 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-793.2j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-793.2n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-793.kk | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-794.04 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-794.1n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.29 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |
| 5-794.2n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-794.b1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 5-794.k9 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| 5-795.k0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-796.0z | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula |
| 5-796.kz | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Skapula |
| 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-799.3 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral |
| 5-79b.0k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.0g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk |
| 5-800.0k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.10 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.2g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-800.40 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.6r | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk |
| 5-800.70 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.8h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-801.0n | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Tarsalgelenk |
| 5-804.7 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| 5-805.1 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisse |
| 5-810.0k | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk |
| 5-810.1g | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-810.20 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-810.50 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-811.2g | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-813.3 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne |
| 5-813.5 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz |
| 5-814.1 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| 5-820.20 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.40 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-821.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.b8 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-829.g | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-829.n | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 5-830.x | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-831.a | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters mit Endoskopie |
| 5-832.x | < 4 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-838.92 | < 4 | Andere komplexe Rekonstruktionen der Wirbelsäule: Dorsal instrumentierte Korrekturspondylodese: Nicht primärstabil, 3 bis 6 Segmente |
| 5-839.63 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |
| 5-839.d0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung eines interspinösen Spreizers: 1 Segment |
| 5-840.01 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.62 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.64 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-850.68 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.c9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-850.ca | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß |
| 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 5-863.3 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation |
| 5-863.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik |
| 5-865.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-866.4 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion |
| 5-866.5 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion |
| 5-892.04 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.14 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.15 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-892.19 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand |
| 5-892.1b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.1d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-892.1e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.06 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.1f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-896.06 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 5-896.0d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 5-896.19 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-896.1x | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige |
| 5-896.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.0c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.16 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla |
| 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 5-901.0e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie |
| 5-932.0x | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-986.x | < 4 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-158.g | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-191.10 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-192.1e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-201.5 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-810.j7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |
| 8-812.62 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-836.0e | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Künstliche Gefäße |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-837.00 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie |
| 8-837.m1 | < 4 | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie |
| 8-83b.ba | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentenfreisetzungsfähiger Ballon an anderen Gefäßen |
| 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 8-840.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-854.72 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirtelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-917.1x | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-313 | < 4 | Ösophagusmanometrie |
| 1-316.11 | < 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung |
| 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-430.2 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-460.2 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| 1-480.5 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken |
| 1-494.4 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Brustwand |
| 1-551.0 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 1-562.3 | < 4 | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Perivesikales Gewebe |
| 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 1-589.1 | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand |
| 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-652.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-691.0 | < 4 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie |
| 1-853.0 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 1-854.1 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk |
| 3-055 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege |
| 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-208 | < 4 | Native Computertomographie der peripheren Gefäße |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-605 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 3-60x | < 4 | Andere Arteriographie |
| 3-614 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-705.1 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 3-742 | < 4 | Positronenemissionstomographie des gesamten Körperstammes |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 3-821 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-010.01 | < 4 | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie |
| 5-013.3 | < 4 | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage intrazerebraler Flüssigkeit |
| 5-023.10 | < 4 | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal |
| 5-024.1 | < 4 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters |
| 5-024.3 | < 4 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett |
| 5-024.5 | < 4 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Umwandlung eines Liquorshunters (oder Hirnwasserableitung) in eine Mehrfachableitung |
| 5-024.7 | < 4 | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage |
| 5-029.10 | < 4 | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-029.11 | < 4 | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-030.1 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, dorsal |
| 5-030.30 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-030.31 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-030.40 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment |
| 5-030.52 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.62 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.30 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment |
| 5-031.8 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Kombiniert transpleural-retroperitoneal |
| 5-032.30 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-032.31 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.32 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.x | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige |
| 5-033.4 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum |
| 5-033.x | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Sonstige |
| 5-038.0 | < 4 | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage |
| 5-039.d | < 4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Entfernung von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation |
| 5-039.f1 | < 4 | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-041.7 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden |
| 5-044.4 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 5-044.9 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Fuß |
| 5-045.4 | < 4 | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-056.4x | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige |
| 5-057.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm |
| 5-057.4 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand |
| 5-059.2 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems |
| 5-059.91 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision von Neurostimulations-elektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Mehrere Elektroden |
| 5-059.a1 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Mehrere Elektroden |
| 5-059.g2 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, wiederaufladbar |
| 5-062.5 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-069.x | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Sonstige |
| 5-183.0 | < 4 | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung) |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-216.1 | < 4 | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal |
| 5-231.00 | < 4 | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn |
| 5-250.2 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision |
| 5-270.3 | < 4 | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Wangenbereich |
| 5-273.1 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Inzision und Drainage, vestibulär subperiostal |
| 5-311.2 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie |
| 5-312.0 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-333.1 | < 4 | Adhäsionolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch |
| 5-346.2 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Verschluss einer Fistel, offen chirurgisch |
| 5-380.02 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-380.12 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-380.13 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Gefäßprothese |
| 5-380.1x | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige |
| 5-380.82 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis |
| 5-380.94 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris |
| 5-381.01 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-381.54 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca externa |
| 5-381.71 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Oberschenkel: A. profunda femoris |
| 5-382.a2 | < 4 | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand |
| 5-383.24 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-383.70 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-383.94 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. axillaris |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-383.9g | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica superior |
| 5-384.71 | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese |
| 5-385.1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Umstechung |
| 5-385.80 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossectomie: V. saphena magna |
| 5-385.90 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna |
| 5-385.d1 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Rezidivcrossectomie: V. saphena parva |
| 5-386.a6 | < 4 | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß |
| 5-388.0x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige |
| 5-388.a5 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 5-389.70 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-389.a1 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm |
| 5-392.11 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Innere AV-Fistel (Cimino-Fistel): Mit Vorverlagerung der Vena basilica |
| 5-392.7 | < 4 | Anlegen eines arteriovenösen Shuntes: Vorverlagerung der Vena basilica als selbständiger Eingriff |
| 5-393.33 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: Aorta: Aortoiliakal |
| 5-393.42 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. iliaca und viszerale Arterien: Iliofemoral |
| 5-393.55 | < 4 | Anlegen eines anderen Shuntes und Bypasses an Blutgefäßen: A. femoralis: Femorocrural |
| 5-394.0 | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Operative Behandlung einer Blutung nach Gefäßoperation |
| 5-394.x | < 4 | Revision einer Blutgefäßoperation: Sonstige |
| 5-395.01 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis communis mit Sinus caroticus |
| 5-395.95 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. brachiocephalica |
| 5-399.2 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-433.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| 5-434.0 | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 5-435.2 | < 4 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose |
| 5-445.10 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Offen chirurgisch |
| 5-448.02 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch |
| 5-448.62 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch |
| 5-448.d2 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Neufixierung eines dislozierten Magenbandes: Laparoskopisch |
| 5-448.x2 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-449.50 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-449.51 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch |
| 5-450.0 | < 4 | Inzision des Darmes: Duodenum |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-454.10 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.50 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-454.y | < 4 | Resektion des Dünndarmes: N.n.bez. |
| 5-455.31 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.4x | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Sonstige |
| 5-455.52 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.62 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.72 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.75 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.a2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.c1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-459.0 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-460.31 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-460.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.21 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch |
| 5-461.40 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.41 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch |
| 5-464.23 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-467.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-467.11 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Jejunum |
| 5-467.13 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon |
| 5-467.53 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon |
| 5-468.12 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum |
| 5-469.03 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.1x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige |
| 5-469.71 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch |
| 5-469.e0 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Offen chirurgisch |
| 5-470.2 | < 4 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-471.1x | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Sonstige |
| 5-471.y | < 4 | Simultane Appendektomie: N.n.bez. |
| 5-482.00 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Peranal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-482.80 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal |
| 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-486.3 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, offen chirurgisch |
| 5-491.0 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) |
| 5-491.15 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös |
| 5-491.16 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal |
| 5-491.4 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinkteren Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |
| 5-492.01 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 5-493.2 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-493.6 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks) |
| 5-501.00 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-501.01 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.2x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige |
| 5-502.1 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2, 3, 4a und 4b] |
| 5-502.4 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Bisegmentektomie [Lobektomie links] [Resektion der Segmente 2 und 3] |
| 5-505.0 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 5-505.x | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-524.2 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 5-530.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-530.3x | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-530.5 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.72 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-531.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-534.01 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| 5-534.02 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus |
| 5-534.3x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige |
| 5-535.31 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-536.46 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik |
| 5-538.0 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-538.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-538.8 | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit allogenem oder xenogenem Material |
| 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-541.4 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-545.1 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-546.22 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-549.0 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle |
| 5-549.4 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Katheterverweilsystems aus dem Bauchraum |
| 5-559.11 | < 4 | Andere Operationen an der Niere: Dekapsulation: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-570.4 | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 5-578.30 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch |
| 5-590.20 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-590.23 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch |
| 5-622.2 | < 4 | Orchidektomie: Inguinalhoden, ohne Epididymektomie |
| 5-636.2 | < 4 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-652.60 | < 4 | Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.32 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-706.23 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalem Fistel: Laparoskopisch |
| 5-760.5 | < 4 | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper und Jochbogen, geschlossen |
| 5-764.24 | < 4 | Reposition einer Fraktur des Corpus mandibulae und des Processus alveolaris mandibulae: Corpus mandibulae, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Materialkombinationen |
| 5-766.3 | < 4 | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen |
| 5-780.0j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Patella |
| 5-780.0m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibiaschaft |
| 5-780.42 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft |
| 5-780.4f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-780.6c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand |
| 5-780.6d | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken |
| 5-780.6h | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal |
| 5-780.6n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal |
| 5-780.7v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale |
| 5-780.8v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 5-780.xz | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Skapula |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-781.ar | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibula distal |
| 5-781.xp | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibula proximal |
| 5-782.10 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula |
| 5-782.2f | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal |
| 5-782.au | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-782.bz | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Skapula |
| 5-782.x1 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Humerus proximal |
| 5-783.0k | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal |
| 5-783.0v | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Metatarsale |
| 5-783.6f | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Femur proximal |
| 5-784.02 | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Humerusschaft |
| 5-784.0k | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Tibia proximal |
| 5-784.0m | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen: Tibiaschaft |
| 5-784.1n | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Tibia distal |
| 5-784.1z | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen: Skapula |
| 5-784.5s | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Talus |
| 5-784.76 | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen: Radius distal |
| 5-784.7k | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen: Tibia proximal |
| 5-784.7x | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen: Sonstige |
| 5-785.1f | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur proximal |
| 5-785.2f | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur proximal |
| 5-785.2t | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Kalkaneus |
| 5-785.2v | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Metatarsale |
| 5-786.1 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 5-786.g | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch intramedullären Draht |
| 5-787.04 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal |
| 5-787.1c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand |
| 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.1f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1s | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus |
| 5-787.1z | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Skapula |
| 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.37 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-787.39 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal |
| 5-787.3b | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale |
| 5-787.3f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal |
| 5-787.3g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| 5-787.3k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-787.3m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft |
| 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.62 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft |
| 5-787.6f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| 5-787.6g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft |
| 5-787.6k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal |
| 5-787.9d | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken |
| 5-787.9m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.g5 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft |
| 5-787.k6 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-787.kh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-787.km | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-787.kn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-787.kt | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-787.x7 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Ulna proximal |
| 5-787.xn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal |
| 5-787.xr | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal |
| 5-787.xx | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige |
| 5-788.06 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.0c | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 2 Phalangen |
| 5-788.56 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| 5-788.5x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige |
| 5-788.66 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-789.36 | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius distal |
| 5-790.0a | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale |
| 5-790.0f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-790.0g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-790.0t | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus |
| 5-790.0v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.13 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-790.1c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.1m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft |
| 5-790.21 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal |
| 5-790.24 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 5-790.29 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-790.31 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal |
| 5-790.43 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus distal |
| 5-790.4h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur distal |
| 5-790.52 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-790.5g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-790.6d | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken |
| 5-790.6h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal |
| 5-790.6k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal |
| 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-790.6r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal |
| 5-790.8e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.k6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-790.k9 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal |
| 5-791.g5 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft |
| 5-791.km | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-792.02 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 5-792.18 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft |
| 5-792.25 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft |
| 5-792.2q | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-792.3g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-792.5g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-792.62 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft |
| 5-792.6m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-792.7m | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-792.k2 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 5-792.k5 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft |
| 5-792.km | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-793.11 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-793.13 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-793.14 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-793.16 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-793.1h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 5-793.31 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal |
| 5-793.33 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal |
| 5-793.39 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |
| 5-793.3f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-793.3n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal |
| 5-793.5e | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-793.bf | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-793.k3 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |
| 5-793.kh | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-793.xf | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-794.06 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-794.13 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.17 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.19 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-794.1h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-794.1j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-794.2k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal |
| 5-794.56 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal |
| 5-794.5k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibia proximal |
| 5-794.bf | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-794.k7 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-794.kn | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-795.10 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-795.2v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-795.30 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-795.kv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-796.00 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-796.0b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-796.0v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-796.1b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-796.2b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-796.2c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 5-796.2v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-796.ku | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale |
| 5-797.1t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus |
| 5-797.3t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus |
| 5-798.4 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring |
| 5-799.1 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral |
| 5-799.2 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal |
| 5-799.4 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal |
| 5-79a.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk |
| 5-79a.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79a.17 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-79a.x7 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-79a.xg | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Hüftgelenk |
| 5-79b.04 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Humeroulnargelenk |
| 5-79b.14 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humeroulnargelenk |
| 5-79b.1a | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk |
| 5-79b.hg | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 5-79b.x1 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.1g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-800.1s | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroradialgelenk |
| 5-800.2h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-800.30 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-800.3q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.4k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.5g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk |
| 5-800.6h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-800.6k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.71 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.8k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-800.cg | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk |
| 5-801.00 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-801.0r | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Zehengelenk |
| 5-802.0 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes |
| 5-802.1 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines hinteren Kreuzbandes |
| 5-802.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-804.6 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellektomie |
| 5-804.8 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL] |
| 5-805.5 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Hintere Kapselplastik |
| 5-806.c | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates |
| 5-806.d | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates |
| 5-807.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige |
| 5-808.6 | < 4 | Arthrodese: Handgelenk |
| 5-808.b0 | < 4 | Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| 5-808.b2 | < 4 | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-809.11 | < 4 | Andere offen chirurgische Gelenkoperationen: Arthrorise: Akromioklavikulargelenk |
| 5-810.40 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-810.4k | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 5-810.5h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk |
| 5-810.71 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Akromioklavikulargelenk |
| 5-810.9h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |
| 5-811.21 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Akromioklavikulargelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-811.3h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| 5-812.01 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk |
| 5-812.0h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-812.e0 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humero-glenoidalgelenk |
| 5-812.kq | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-813.9 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release) |
| 5-814.2 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| 5-814.4 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
| 5-819.00 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-821.10 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert |
| 5-821.18 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.24 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.25 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.29 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.33 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenprothese |
| 5-822.g2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h1 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-823.26 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.41 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese |
| 5-823.b0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.bb | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-824.00 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Oberflächenersatzprothese |
| 5-824.x | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Sonstige |
| 5-825.11 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, konventionell |
| 5-825.12 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers |
| 5-826.2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Vorfuß- oder Zehenendoprothese |
| 5-829.1 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk |
| 5-829.3 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk |
| 5-829.e | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 5-829.f | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern |
| 5-831.x | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige |
| 5-832.9 | < 4 | Exzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen) |
| 5-836.33 | < 4 | Spondylodese: Dorsal: 6 oder mehr Segmente |
| 5-837.01 | < 4 | Wirbelkörperersatz und komplexe Rekonstruktion der Wirbelsäule: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper |
| 5-839.11 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibendoprothese: 2 Segmente |
| 5-839.4 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung einer Bandscheibendoprothese |
| 5-839.90 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-839.a2 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-839.a3 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-839.h1 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Destruktion von knöchernem Gewebe durch Radiofrequenzablation, perkutan: 2 Wirbelkörper |
| 5-83b.20 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.33 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.41 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente |
| 5-83w.1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Dynamische Stabilisierung |
| 5-840.4x | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige |
| 5-840.60 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk |
| 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.84 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger |
| 5-844.35 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-844.36 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger |
| 5-844.53 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 5-850.b2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-850.ba | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-850.d8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.68 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.c9 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel |
| 5-852.0a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß |
| 5-852.2a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Fuß |
| 5-852.45 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Brustwand und Rücken |
| 5-852.96 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Bauchregion |
| 5-852.ba | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentresektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Fuß |
| 5-852.f8 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehngewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.18 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-854.09 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel |
| 5-854.2c | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Mittelfuß und Zehen |
| 5-854.x9 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Unterschenkel |
| 5-854.xc | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Sonstige: Mittelfuß und Zehen |
| 5-855.08 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.13 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm |
| 5-855.1a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß |
| 5-855.58 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.68 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Oberschenkel und Knie |
| 5-856.06 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion |
| 5-859.y | < 4 | Anderer Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: N.n.bez. |
| 5-864.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel |
| 5-864.a | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel |
| 5-865.90 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-881.1 | < 4 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 5-891 | < 4 | Inzision eines Sinus pilonidalis |
| 5-892.00 | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Lippe |
| 5-892.07 | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.0a | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-892.0x | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige |
| 5-892.10 | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Lippe |
| 5-892.1a | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 5-892.1x | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige |
| 5-892.27 | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.29 | < 4 | Anderer Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-892.2e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.2f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterschenkel |
| 5-892.36 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-892.xd | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 5-894.0a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.0c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.0d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.26 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-895.2a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.2b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-895.3e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie |
| 5-895.44 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.04 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.05 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals |
| 5-896.2a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-896.2f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-896.x6 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla |
| 5-896.x7 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.xe | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.xf | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel |
| 5-896.xg | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß |
| 5-898.4 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-900.0x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige |
| 5-900.17 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 5-902.04 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-902.4g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß |
| 5-902.5g | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß |
| 5-909.x4 | < 4 | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| 5-913.x0 | < 4 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Lippe |
| 5-916.a2 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 5-916.ax | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige |
| 5-930.3 | < 4 | Art des Transplantates: Xenogen |
| 5-931.2 | < 4 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Faserverbundwerkstoff |
| 5-932.2 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material |
| 6-002.pb | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg |
| 6-002.pg | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg |
| 6-003.k3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg |
| 6-003.k6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg |
| 8-020.4 | < 4 | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe |
| 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-102.7 | < 4 | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand |
| 8-115.3 | < 4 | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, obere Extremität |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-146.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-148.1 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum |
| 8-151.2 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikelshunt |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-176.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-178.0 | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-190.40 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.20 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 8-192.09 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-192.0x | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige |
| 8-192.18 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm |
| 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-192.2g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß |
| 8-192.36 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla |
| 8-192.xa | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 8-192.xe | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 8-200.1 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal |
| 8-200.5 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |
| 8-200.9 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal |
| 8-200.n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal |
| 8-200.q | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibulaschaft |
| 8-200.r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal |
| 8-201.k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk |
| 8-202.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition |
| 8-401.2 | < 4 | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur |
| 8-401.3 | < 4 | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Tibia |
| 8-640.1 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 8-650 | < 4 | Elektrotherapie |
| 8-800.0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE |
| 8-800.f1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.e8 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-810.j6 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g |
| 8-810.jg | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g |
| 8-810.y | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: N.n.bez. |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.56 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 8-812.58 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE |
| 8-812.63 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE |
| 8-821.0 | < 4 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen |
| 8-836.03 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Gefäße Unterarm |
| 8-836.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Angioplastie (Ballon): Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.82 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-840.0c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel |
| 8-840.0q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-840.1s | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel |
| 8-841.1c | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße Unterschenkel |
| 8-849.02 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen ungedeckten großlumigen Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-84a.1q | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von sonstigen gedeckten großlumigen Stents: Zwei oder mehr Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-853.71 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-853.72 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-853.74 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.62 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-854.63 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-854.71 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-854.73 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-855.81 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-900 | < 4 | Intravenöse Anästhesie |
| 8-914.01 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-917.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 8-931.1 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 9-200.0 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte |
| 9-200.6 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 9-200.9 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte |

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leis-tungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) ◦ Chirurgie der Bewegungsstörungen (VC49) | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Spezialsprechstunde (VC58) ◦ Wirbelsäulenchirurgie (VC65) ◦ Arthroskopische Operationen (VC66) ◦ Verbrennungschirurgie (VC69) ◦ Notfallmedizin (VC71) ◦ Physikalische Therapie (VI39) ◦ Schmerztherapie (VI40) ◦ Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01) ◦ Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes (VO02) ◦ Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03) ◦ Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) ◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10) ◦ Endoprothetik (VO14) ◦ Fußchirurgie (VO15) ◦ Handchirurgie (VO16) ◦ Schulterchirurgie (VO19) ◦ Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20) ◦ Computertomographie (CT), nativ (VR10) ◦ Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) ◦ Szintigraphie (VR18) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) ◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) ◦ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) | |
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40) ◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41) | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42) ◦ Chirurgie der Bewegungsstörungen (VC49) ◦ Verbrennungschirurgie (VC69) ◦ Notfallmedizin (VC71) ◦ Fußchirurgie (VO15) ◦ Schulterchirurgie (VO19) ◦ Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01) ◦ Computertomographie (CT), nativ (VR10) ◦ Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11) ◦ Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12) ◦ Szintigraphie (VR18) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) ◦ Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24) ◦ Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25) ◦ Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26) | |

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 3-613 | 50 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 5-399.5 | 40 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-056.40 | 34 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-841.11 | 23 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-399.7 | 18 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 1-697.7 | 17 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-812.eh | 17 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-812.5 | 16 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-787.1r | 13 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-810.0h | 13 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-811.2h | 12 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-849.0 | 11 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-787.36 | 10 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 5-811.0h | 9 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-841.14 | 9 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-385.70 | 8 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5-787.0b | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-790.1b | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-841.61 | 8 | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Retinaculum flexorum |
| 5-790.1c | 7 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-859.12 | 6 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-787.0c | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |
| 5-811.1h | 5 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-385.96 | 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairese (als selbständiger Eingriff): Seitenastvarize |
| 5-492.00 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-787.16 | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal |
| 5-787.1k | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1n | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-841.15 | 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-851.12 | 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-041.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-640.3 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-787.06 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-790.2b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-378.01 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-787.05 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft |
| 5-787.09 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal |
| 5-787.18 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulnaschaft |
| 5-787.2v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-787.34 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal |
| 5-787.g8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.gb | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale |
| 5-812.7 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-812.fh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger |
| 5-897.0 | < 4 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 8-201.s | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kiefergelenk |
| 1-697.8 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk |
| 5-039.35 | < 4 | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel mehrerer permanenter Elektroden zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan |
| 5-041.7 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden |
| 5-385.4 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Transkutane Unterbindung der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) |
| 5-385.82 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: (Isolierte) Crossektomie: V. saphena parva |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-493.2 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-530.31 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-530.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-534.01 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| 5-534.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-636.2 | < 4 | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion] |
| 5-787.08 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.0j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.0n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-787.0v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale |
| 5-787.13 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal |
| 5-787.1f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.1h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.2f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-787.2k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-787.2n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.37 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal |
| 5-787.38 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft |
| 5-787.65 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radiuschaft |
| 5-787.68 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulnaschaft |
| 5-787.95 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft |
| 5-787.96 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal |
| 5-787.9c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Phalangen Hand |
| 5-787.g0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula |
| 5-787.g5 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft |
| 5-787.gc | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-787.ma | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Karpale |
| 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-788.0c | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 2 Phalangen |
| 5-788.5c | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal |
| 5-790.13 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-790.2v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale |
| 5-795.2c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.1c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-79b.6d | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Interphalangealgelenk |
| 5-800.6r | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk |
| 5-800.81 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.9n | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Tarsalgelenk |
| 5-808.b2 | < 4 | Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-810.0k | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk |
| 5-810.3h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-811.2k | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.0h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-812.ek | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-840.04 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.42 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.74 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.80 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk |
| 5-840.87 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Langfinger |
| 5-840.c4 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger |
| 5-841.01 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum |
| 5-841.05 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-844.56 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger |
| 5-845.04 | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger |
| 5-850.00 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals |
| 5-850.60 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Kopf und Hals |
| 5-850.65 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Brustwand und Rücken |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-850.a5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| 5-852.69 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel |
| 5-852.95 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken |
| 5-852.98 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie |
| 5-854.0c | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen |
| 5-859.2a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| 5-863.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik |
| 5-897.1 | < 4 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion |
| 5-903.14 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-903.19 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand |

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|---|--|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| stationäre BG-Zulassung: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 20,87 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 20,87 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 1,25 | |
| Stationäre Versorgung | 19,62 | |
| Fälle je VK/Person | 156,16717 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|--|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 9,65 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,65 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,75 | |
| Stationäre Versorgung | 8,90 | |
| Fälle je VK/Person | 344,26966 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |
| AQ07 | Gefäßchirurgie | |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| AQ13 | Viszeralchirurgie | |
| AQ41 | Neurochirurgie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF31 | Phlebologie | |
| ZF34 | Proktologie | |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie | Dauer 4 Jahre |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 56,53 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 56,53 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 5,80 | |
| Stationäre Versorgung | 50,73 | |
| Fälle je VK/Person | 60,39818 | |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,00 | |
| Stationäre Versorgung | 1,00 | |
| Fälle je VK/Person | 3064,00000 | |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,52 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,52 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,14 | |
| Stationäre Versorgung | 1,38 | |
| Fälle je VK/Person | 2220,28985 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|-----------|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 12,50 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,50 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 4,20 | |
| Stationäre Versorgung | 8,30 | |
| Fälle je VK/Person | 369,15662 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------------|--|--------------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ08 | Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-4.1 Frauenheilkunde und Geburtshilfe

| | |
|--|----------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Fachabteilungsschlüssel | 2400 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|------------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/gynaekologie-geburtshilfe/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Dr. med. Istvan Szini | Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe | 05631 / 569 - 186 | 05631 / 569 - 441 | Gyn@krankenhaus-korbach.de |

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------------|---|--|
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VG00 | Rekonstruktion der Brust und kosmetische Eingriffe | |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | Neben Mammografie kommt die sonografisch gesteuerte Hochgeschwindigkeits-Stanzbiopsie zum Einsatz (auch amb. durchführbar). Zur Behandlung des Brustkrebs wird z.B. die intraoperative Darstellung der Wächter- (Sentinel)-Lymphknoten angewandt |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie | |
| VG05 | Endoskopische Operationen | |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | Zusätzlich zu den herkömmlichen Operationsmethoden kommen künstliche Bänder (Tapes) bzw. Netze (Meshes) als innovative Verfahren zum Einsatz. |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | Im Vorfeld der Operation führen wir eine umfassende Diagnostik durch. Weiterhin Operationen aller gynäkologischen Krebserkrankungen, amb. Chemotherapie, operative und medikamentöse Therapie bei Krebserkrankungen der Brust und des weibl. Genitale als Kooperationshaus des Brustzentrums Regio. |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | |
| VG15 | Spezialsprechstunde | |
| VG16 | Urogynäkologie | |
| VG19 | Ambulante Entbindung | |

B-4.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-4.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1150 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-4.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| Z38.0 | 252 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| O80 | 61 | Spontangeburt eines Einlings |
| D27 | 43 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| O26.8 | 39 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O70.0 | 32 | Dammriss 1. Grades unter der Geburt |
| D25.1 | 25 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| N83.2 | 20 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| O20.0 | 19 | Drohender Abort |
| O48 | 19 | Übertragene Schwangerschaft |
| O70.1 | 17 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |
| O62.1 | 16 | Sekundäre Wehenschwäche |
| O42.0 | 14 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O68.0 | 13 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| N83.1 | 12 | Zyste des Corpus luteum |
| N84.0 | 12 | Polyp des Corpus uteri |
| O34.2 | 12 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| O60.0 | 12 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| O65.5 | 12 | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| O21.1 | 11 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| O99.0 | 11 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| N80.1 | 10 | Endometriose des Ovars |
| O00.1 | 10 | Tubargravidität |
| O47.1 | 10 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O64.1 | 10 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| C56 | 9 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| P92.5 | 9 | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung |
| N72 | 8 | Entzündliche Krankheit der Cervix uteri |
| N80.3 | 8 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| O21.0 | 8 | Leichte Hyperemesis gravidarum |
| O28.8 | 8 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O34.3 | 8 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz |
| D25.0 | 7 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| D25.2 | 7 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| O03.1 | 7 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O63.1 | 7 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt) |
| O82 | 7 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| C50.4 | 6 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C54.1 | 6 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| N81.3 | 6 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N99.3 | 6 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| O14.0 | 6 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| O36.3 | 6 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie |
| O63.0 | 6 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt) |
| O68.1 | 6 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| O71.4 | 6 | Hoher Scheidenriss unter der Geburt |
| O90.8 | 6 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |
| P08.1 | 6 | Sonstige für das Gestationsalter zu schwere Neugeborene |
| P12.0 | 6 | Kephalhämatom durch Geburtsverletzung |
| R10.3 | 6 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| K66.0 | 5 | Peritoneale Adhäsionen |
| N80.0 | 5 | Endometriose des Uterus |
| N81.2 | 5 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| N84.1 | 5 | Polyp der Cervix uteri |
| O02.1 | 5 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| O03.4 | 5 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O99.6 | 5 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P59.8 | 5 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| C50.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| N76.4 | 4 | Abszess der Vulva |
| N83.8 | 4 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| N85.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus |
| N92.0 | 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| O21.8 | 4 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert |
| O61.0 | 4 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| O69.1 | 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| O91.2 | 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation |
| O99.5 | 4 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| P05.1 | 4 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |
| C50.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| D06.0 | < 4 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| N85.0 | < 4 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| N94.5 | < 4 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| O14.1 | < 4 | Schwere Präeklampsie |
| O21.2 | < 4 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| O33.4 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen Missverhältnis bei kombinierter mütterlicher und fetaler Ursache |
| O33.5 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| O41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute |
| O46.8 | < 4 | Sonstige präpartale Blutung |
| O69.2 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression |
| O72.1 | < 4 | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung |
| O90.1 | < 4 | Dehiszenz einer geburtshilflichen Dammwunde |
| O99.3 | < 4 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P07.3 | < 4 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| P28.2 | < 4 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| C50.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| D24 | < 4 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] |
| D28.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Tubae uterinae und Ligamenta |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.3 | < 4 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| N61 | < 4 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| N75.1 | < 4 | Bartholin-Abszess |
| N81.1 | < 4 | Zystozele |
| N83.0 | < 4 | Follikelzyste des Ovars |
| N88.1 | < 4 | Alter Riss der Cervix uteri |
| N98.1 | < 4 | Hyperstimulation der Ovarien |
| O08.1 | < 4 | Spätblutung oder verstärkte Blutung nach Abort, Extrauterin gravidität und Mollenschwangerschaft |
| O13 | < 4 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O20.8 | < 4 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| O24.4 | < 4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| O36.5 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O41.0 | < 4 | Oligohydramnion |
| O43.2 | < 4 | Krankhaft anhaftende Plazenta |
| O47.0 | < 4 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O66.2 | < 4 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| O68.2 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| O69.8 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen |
| O72.2 | < 4 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P07.1 | < 4 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht |
| P15.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Geburtsverletzungen |
| P83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Haut, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind |
| Q50.5 | < 4 | Embryonale Zyste des Lig. latum uteri |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| Q66.8 | < 4 | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße |
| C51.0 | < 4 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C51.2 | < 4 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C51.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| D07.1 | < 4 | Carcinoma in situ: Vulva |
| D20.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Peritoneum |
| K36 | < 4 | Sonstige Appendizitis |
| K52.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| L72.0 | < 4 | Epidermalzyste |
| L90.0 | < 4 | Lichen sclerosus et atrophicus |
| M35.2 | < 4 | Behçet-Krankheit |
| M54.1 | < 4 | Radikulopathie |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N60.1 | < 4 | Diffuse zystische Mastopathie |
| N60.2 | < 4 | Fibroadenose der Mamma |
| N64.1 | < 4 | Fettgewebsnekrose der Mamma |
| N64.5 | < 4 | Sonstige Symptome der Mamma |
| N64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma |
| N70.0 | < 4 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| N70.1 | < 4 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| N73.3 | < 4 | Akute Pelveoperitonitis bei der Frau |
| N80.8 | < 4 | Sonstige Endometriose |
| N83.3 | < 4 | Erworbene Atrophie des Ovars und der Tuba uterina |
| N83.5 | < 4 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| N83.6 | < 4 | Hämatosalpinx |
| N84.2 | < 4 | Polyp der Vagina |
| N85.2 | < 4 | Hypertrophie des Uterus |
| N85.6 | < 4 | Intrauterine Synechien |
| N85.7 | < 4 | Hämatometra |
| N89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina |
| N90.4 | < 4 | Leukoplakie der Vulva |
| N92.1 | < 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| N92.4 | < 4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause |
| N92.5 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation |
| N94.0 | < 4 | Mittelschmerz |
| N94.4 | < 4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| N95.0 | < 4 | Postmenopausenblutung |
| N97.1 | < 4 | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau |
| O02.0 | < 4 | Abortivei und sonstige Molen |
| O04.6 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O04.9 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O05.1 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O05.4 | < 4 | Sonstiger Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O06.6 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O08.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft |
| O14.2 | < 4 | HELLP-Syndrom |
| O15.9 | < 4 | Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist |
| O22.1 | < 4 | Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft |
| O23.0 | < 4 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| O23.3 | < 4 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O30.0 | < 4 | Zwillingsschwangerschaft |
| O32.1 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| O34.8 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane |
| O36.4 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| O36.6 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |
| O41.1 | < 4 | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| O42.2 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie |
| O43.1 | < 4 | Fehlbildung der Plazenta |
| O44.1 | < 4 | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung |
| O60.1 | < 4 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| O62.0 | < 4 | Primäre Wehenschwäche |
| O62.8 | < 4 | Sonstige abnorme Wehentätigkeit |
| O64.0 | < 4 | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| O64.2 | < 4 | Geburtshindernis durch Gesichtslage |
| O64.4 | < 4 | Geburtshindernis durch Querlage |
| O65.8 | < 4 | Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des mütterlichen Beckens |
| O70.2 | < 4 | Dammriss 3. Grades unter der Geburt |
| O70.3 | < 4 | Dammriss 4. Grades unter der Geburt |
| O71.3 | < 4 | Zervixriss unter der Geburt |
| O71.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen unter der Geburt |
| O73.0 | < 4 | Retention der Plazenta ohne Blutung |
| O75.7 | < 4 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| O91.1 | < 4 | Abszess der Mamma im Zusammenhang mit der Gestation |
| O92.1 | < 4 | Rhagade der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation |
| O98.3 | < 4 | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P00.2 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter |
| P05.0 | < 4 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| P08.0 | < 4 | Übergewichtige Neugeborene |
| P12.1 | < 4 | Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung |
| P13.4 | < 4 | Klavikulafraktur durch Geburtsverletzung |
| P22.1 | < 4 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| P28.4 | < 4 | Sonstige Apnoe beim Neugeborenen |
| P28.5 | < 4 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| P29.8 | < 4 | Sonstige kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode |
| P36.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen |
| P39.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| P58.8 | < 4 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete gesteigerte Hämolyse |
| P59.0 | < 4 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| P59.9 | < 4 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| P70.4 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| P83.1 | < 4 | Erythema toxicum neonatorum |
| P92.2 | < 4 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| P92.8 | < 4 | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen |
| P96.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| Q05.7 | < 4 | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus |
| Q52.3 | < 4 | Hymenalatresie |
| Q67.4 | < 4 | Sonstige angeborene Deformitäten des Schädels, des Gesichtes und des Kiefers |
| R18 | < 4 | Aszites |
| T85.6 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 9-262.0 | 309 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 1-208.0 | 268 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP] |
| 9-261 | 190 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 9-260 | 124 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 5-469.21 | 95 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-730 | 75 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 1-471.2 | 67 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 5-657.62 | 65 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-758.3 | 64 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 1-672 | 63 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-738.0 | 50 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 5-653.32 | 48 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.62 | 36 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.92 | 35 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-749.0 | 33 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 8-910 | 32 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 5-657.92 | 28 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-758.4 | 28 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 8-930 | 28 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-749.10 | 27 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-758.2 | 27 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 5-569.31 | 26 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 5-740.1 | 24 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-681.4 | 20 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |
| 5-690.0 | 20 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-932.00 | 20 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material: Ohne Beschichtung |
| 5-682.02 | 18 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-728.0 | 18 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-702.2 | 16 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-740.0 | 16 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-683.03 | 15 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.4c | 15 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-749.11 | 15 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-738.2 | 13 | Episiotomie und Naht: Naht einer Episiotomie als selbständige Maßnahme |
| 5-681.33 | 12 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| 5-683.23 | 12 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-401.11 | 11 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 8-561.1 | 11 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-919 | 11 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 1-694 | 10 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-704.01 | 10 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-469.20 | 9 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch |
| 5-657.72 | 9 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-707.1 | 9 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Douglasplastik |
| 5-651.82 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-728.1 | 8 | Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte |
| 8-831.0 | 8 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 9-262.1 | 8 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 3-709.x | 7 | Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige |
| 5-660.4 | 7 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.42 | 7 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-870.a2 | 7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) |
| 8-560.2 | 7 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 3-70c.x | 6 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Sonstige |
| 5-661.60 | 6 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-681.83 | 6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 5-690.1 | 6 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 5-693 | 6 | Plastische Rekonstruktion der Parametrien (bei Lagekorrektur des Uterus) |
| 5-872.1 | 6 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 9-280.0 | 6 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 9-984.7 | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 5-656.92 | 5 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.82 | 5 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-667.1 | 5 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 5-671.02 | 5 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Messerkonisation |
| 5-681.82 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.x | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Sonstige |
| 5-702.1 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 5-744.02 | 5 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 8-800.c0 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-70c.1 | 4 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Tumorszintigraphie mit tumorselektiven Substanzen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-543.21 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-543.40 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell |
| 5-569.30 | 4 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-653.22 | 4 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.2 | 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-690.x | 4 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Sonstige |
| 5-756.1 | 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 5-881.1 | 4 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 1-207.0 | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-470.5 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 3-709.0 | < 4 | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik |
| 5-652.62 | < 4 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.60 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-663.30 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Fimbriektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-670 | < 4 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-710 | < 4 | Inzision der Vulva |
| 5-881.0 | < 4 | Inzision der Mamma: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-882.3 | < 4 | Operationen an der Brustwarze: Transposition |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 9-280.1 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-471.0 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strichkürettage) |
| 1-571.1 | < 4 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri |
| 1-579.x | < 4 | Biopsie an anderen weiblichen Geschlechtsorganen durch Inzision: Sonstige |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 3-72x | < 4 | Andere Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 5-402.12 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-470.0 | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-599.00 | < 4 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 5-651.b2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.30 | < 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-656.82 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Rekonstruktion (nach Verletzung oder Ruptur): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-658.6 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |
| 5-661.50 | < 4 | Salpingektomie: Partiiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.52 | < 4 | Salpingektomie: Partiiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-665.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-666.92 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina: Fimbrioplastik: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.92 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.01 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal |
| 5-691 | < 4 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-695.02 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.4 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-703.1 | < 4 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpektomie, subtotal |
| 5-704.5c | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-711.1 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-714.5 | < 4 | Vulvektomie: Total |
| 5-741.0 | < 4 | Sectio caesarea, suprazervikal und korporal: Primär, suprazervikal |
| 5-751 | < 4 | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio] |
| 5-756.0 | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| 5-756.x | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| 5-758.0 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |
| 5-758.6 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva, Naht des Sphincter ani und Naht am Rektum |
| 5-870.91 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a4 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe |
| 5-879.x | < 4 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Sonstige |
| 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 8-176.2 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-470.0 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Ovar |
| 1-490.x | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige |
| 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-493.8 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-501 | < 4 | Biopsie der Mamma durch Inzision |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-559.4 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 1-853.0 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 3-036 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung |
| 3-13g | < 4 | Urethrographie |
| 3-207 | < 4 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-222 | < 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-225 | < 4 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-800 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-343.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen |
| 5-401.13 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Mit Radionuklid- und Farbmarkierung, kombiniert (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-401.90 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung |
| 5-401.b | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie] |
| 5-402.11 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 |
| 5-402.g | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-404.02 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Axillär: Level 1 und 2 |
| 5-406.4 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Inguinal |
| 5-406.b | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, laparoskopisch |
| 5-407.03 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Axillär: Level 1, 2 und 3 |
| 5-407.2 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| 5-433.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-451.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-464.x3 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon |
| 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-470.1x | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-486.0 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 5-490.1 | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-511.51 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-534.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-541.1 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 5-542.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-543.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Destruktion |
| 5-543.x | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-573.40 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 5-578.0x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-582.0 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-584.7x | < 4 | Rekonstruktion der Urethra: Plastische Rekonstruktion, einzeitig: Sonstige |
| 5-590.33 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch |
| 5-593.20 | < 4 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-595.10 | < 4 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-650.4 | < 4 | Inzision des Ovars: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.9x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Sonstige |
| 5-652.42 | < 4 | Ovariectomie: Restovariectomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.52 | < 4 | Ovariectomie: Partiiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.63 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-657.90 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-661.55 | < 4 | Salpingektomie: Partiiell: Vaginal |
| 5-663.02 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Elektrokoagulation: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-663.50 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Unterbindung mit Durchtrennung oder Destruktion: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-672.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision |
| 5-681.32 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-682.12 | < 4 | Subtotale Uterusexstirpation: Supravaginal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.00 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariectomie: Offen chirurgisch (abdominal) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-683.02 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-683.13 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, einseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.20 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.22 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal, laparoskopisch assistiert |
| 5-695.32 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Metroplastik: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Hymenektomie |
| 5-704.00 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-704.11 | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-704.4g | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-706.0 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-709 | < 4 | Andere Operationen an Vagina und Douglasraum |
| 5-712.0 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 5-714.40 | < 4 | Vulvektomie: Partiiell: Mit Entfernung von einem Viertel bis weniger als der Hälfte der Vulva (90° bis weniger als 180°) |
| 5-714.60 | < 4 | Vulvektomie: En bloc, mit inguinaler und femoraler Lymphadenektomie: Ohne Entfernung der Haut der Inguinalfalte |
| 5-716.1 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion |
| 5-757 | < 4 | Uterusexstirpation, geburtshilflich |
| 5-758.5 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 5-857.95 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskelappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken |
| 5-870.90 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation |
| 5-870.a1 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) |
| 5-870.a3 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie |
| 5-870.a5 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mammareduktionsplastik |
| 5-870.a6 | < 4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammagewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik |
| 5-874.0 | < 4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion des M. pectoralis major |
| 5-874.1 | < 4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Mit Teilresektion der Mm. pectorales majores et minores |
| 5-874.x | < 4 | Erweiterte (radikale) Mastektomie mit Resektion an den Mm. pectorales majores et minores und Thoraxwandteilresektion: Sonstige |
| 5-879.1 | < 4 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-882.7 | < 4 | Operationen an der Brustwarze: Chirurgische Eversion einer invertierten Brustwarze |
| 5-886.0 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Naht (nach Verletzung) |
| 5-886.2x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Sonstige |
| 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-903.6a | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-907.0b | < 4 | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion |
| 5-98c.2 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-148.3 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin |
| 8-149.x | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-192.0a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-711.x | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Sonstige |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-831.x | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Sonstige |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse (VG01) ◦ Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse (VG02) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse (VG03) ◦ Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren (VG08) ◦ Betreuung von Risikoschwangerschaften (VG10) ◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (VG11) ◦ Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (VG13) ◦ Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (VG14) ◦ Urogynäkologie (VG16) | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 1-672 | 169 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-471.2 | 153 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 1-502.4 | 56 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 5-751 | 36 | Kürettage zur Beendigung der Schwangerschaft [Abruptio] |
| 5-690.0 | 20 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-690.2 | 15 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-691 | 10 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-690.1 | 6 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 1-694 | 5 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.62 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.82 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.62 | < 4 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-675.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Cervix uteri: Naht (nach Verletzung) |
| 5-681.83 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 5-711.1 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 5-881.1 | < 4 | Inzision der Mamma: Drainage |
| 8-100.d | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie |

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 5,65 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,65 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,5 | |
| Stationäre Versorgung | 5,15 | |
| Fälle je VK/Person | 223,30097 | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Anzahl Vollkräfte | 4,28 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,28 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,25 | |
| Stationäre Versorgung | 4,03 | |
| Fälle je VK/Person | 285,35980 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 6,36 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,36 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,36 | |
| Stationäre Versorgung | 6,00 | |
| Fälle je VK/Person | 191,66666 | |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,24 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,24 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,05 | |
| Stationäre Versorgung | 0,19 | |
| Fälle je VK/Person | 6052,63157 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Anzahl Vollkräfte | 2,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,00 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,73 | |
| Stationäre Versorgung | 1,27 | |
| Fälle je VK/Person | 905,51181 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ16 | Familienhebamme | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP28 | Still- und Laktationsberatung | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-5.1 Anästhesie und Intensivmedizin

| | |
|--|--------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Anästhesie und Intensivmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel | 3600 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|---------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/anaesthesiologie-operative-intensivmedizin-notfallmedizin/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dr. med. Michael Tübben | Chefarzt Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin | 05631 / 569 - 401 | 05631 / 569 - 440 | anaesthesie@krankenhaus-korbach.de |

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-5.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------------|--|
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI42 | Transfusionsmedizin | Qualitätsbeauftragter Arzt Hämotherapie |
| VX00 | Operative Intensivmedizin | Der Abteilung obliegt die organisatorische Leitung der interdisziplinären Intensivstation mit 10 Betten und betreut verantwortlich die operativen Intensivpatienten unseres Hauses. |
| VZ00 | Operative Intensivmedizin | Die Abteilung führt im Jahr ca. 4.400 Narkosen bei Patienten ab dem 2. Lebensalter und aller Risikostufen durch. Dabei kommen alle derzeit gängigen Anästhesieverfahren zur Anwendung. Die Anästhesieabteilung versorgt die operativen PatientenInnen aller Fachabteilungen. |

B-5.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-5.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-5.6 Diagnosen nach ICD

keine Angaben

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

keine Angaben

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

keine Angaben

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

keine Angaben

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-5.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | | |
|---|------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 9,92 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,92 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 1,00 | |
| Stationäre Versorgung | 8,92 | |
| Fälle je VK/Person | | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | | |
|---|------|--------------|
| Anzahl Vollkräfte | 8,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,00 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |
| Ambulante Versorgung | 0,50 | |
| Stationäre Versorgung | 7,50 | |
| Fälle je VK/Person | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| AQ01 | Anästhesiologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin | Intensivmedizin, spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|-------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 10,17 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,17 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 2,09 | |
| Stationäre Versorgung | 8,08 | |
| Fälle je VK/Person | | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|------|--------------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,15 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,15 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,19 | |
| Stationäre Versorgung | 0,96 | |
| Fälle je VK/Person | | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensivpflege und Anästhesie | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP09 | Kontinenzmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP27 | OP-Koordination | |
| ZP29 | Stroke Unit Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-6.1 Urologie

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Urologie |
| Fachabteilungsschlüssel | 2200 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|---------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/urologie/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Heiko Velte | Facharzt für Urologie | 05631 / 6878 | | praxis@go-urologie.de |
| Dr. med. Dirk Gumbel | Facharzt für Urologie | 05631 / 6878 | | praxis@go-urologie.de |
| Dr. med. Alexander Otto | Facharzt für Urologie | 05631 / 6878 | | praxis@go-urologie.de |
| Dr. med. Marc Ohlmann | Facharzt für Urologie | 05631 / 6878 | | praxis@go-urologie.de |

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|--|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| VU01 | Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenerkrankungen | |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis | |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | |
| VU08 | Kinderurologie | |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase | |
| VU11 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | |
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VU13 | Tumorchirurgie | |
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik | |

B-6.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-6.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|--------------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 482 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-6.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| N20.0 | 77 | Nierenstein |
| N13.2 | 44 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| C61 | 39 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| N40 | 28 | Prostatahyperplasie |
| N20.1 | 25 | Ureterstein |
| R39.1 | 20 | Sonstige Miktionsstörungen |
| N39.0 | 19 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| C67.2 | 17 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| N39.4 | 14 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| C67.8 | 12 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| N41.0 | 11 | Akute Prostatitis |
| R31 | 11 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R33 | 8 | Harnverhaltung |
| N13.6 | 7 | Pyonephrose |
| N30.0 | 7 | Akute Zystitis |
| N32.8 | 7 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N35.8 | 7 | Sonstige Harnröhrenstriktur |
| N41.1 | 7 | Chronische Prostatitis |
| N45.9 | 7 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| N13.1 | 6 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N13.3 | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N30.2 | 6 | Sonstige chronische Zystitis |
| N43.2 | 6 | Sonstige Hydrozele |
| C67.4 | 5 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| N10 | 5 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N31.0 | 5 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| N49.2 | 5 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
| N99.1 | 5 | Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen |
| C67.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.6 | 4 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| N47 | 4 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| T81.0 | 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| N13.0 | < 4 | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion |
| N20.2 | < 4 | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig |
| N45.0 | < 4 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
| T83.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| N13.5 | < 4 | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose |
| N21.0 | < 4 | Stein in der Harnblase |
| N32.0 | < 4 | Blasenhalsostruktion |
| N42.1 | < 4 | Kongestion und Blutung der Prostata |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| N44.1 | < 4 | Hydatidentorsion |
| R32 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz |
| T83.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
| C62.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C67.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| D29.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Prostata |
| J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K59.0 | < 4 | Obstipation |
| L08.0 | < 4 | Pyodermie |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| N02.9 | < 4 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N11.1 | < 4 | Chronische obstruktive Pyelonephritis |
| N28.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| N30.8 | < 4 | Sonstige Zystitis |
| N35.9 | < 4 | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet |
| N36.2 | < 4 | Harnröhrenkarunkel |
| N42.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Prostata |
| N43.0 | < 4 | Funikulozele |
| N43.1 | < 4 | Infizierte Hydrozele |
| N44.0 | < 4 | Hodentorsion |
| N46 | < 4 | Sterilität beim Mann |
| R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R77.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine |
| T19.8 | < 4 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen des Urogenitaltraktes |
| T83.0 | < 4 | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter) |
| Z03.1 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung |

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-132.3 | 140 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-110.2 | 70 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere |
| 3-992 | 61 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 1-464.00 | 56 | Transrektale Biopsie an männlichen Geschlechtsorganen: Stanzbiopsie der Prostata: Weniger als 20 Zylinder |
| 5-572.1 | 53 | Zystostomie: Perkutan |
| 8-137.00 | 53 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 3-13d.5 | 50 | Urographie: Retrograd |
| 5-573.40 | 41 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt |
| 5-562.5 | 24 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-601.1 | 24 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie |
| 3-207 | 22 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 5-985.x | 22 | Lasertechnik: Sonstige |
| 8-137.10 | 17 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-573.41 | 16 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävin-säure |
| 9-984.7 | 15 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.8 | 15 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-661 | 13 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-579.62 | 13 | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral |
| 5-585.1 | 12 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 8-137.2 | 12 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 3-13g | 9 | Urethrographie |
| 8-930 | 9 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-611 | 7 | Operation einer Hydrocele testis |
| 8-137.13 | 7 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ |
| 8-133.0 | 6 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 5-550.1 | 5 | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie |
| 5-562.4 | 5 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch |
| 5-562.8 | 5 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen |
| 5-570.0 | 5 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-640.2 | 5 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 8-502 | 5 | Tamponade einer Rektumblutung |
| 1-665 | 4 | Diagnostische Ureterorenoskopie |
| 1-693.1 | 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Ureterorenoskopie |
| 6-003.8 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 8-110.0 | 4 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Harnblase |
| 5-622.1 | < 4 | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-137.03 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ |
| 8-561.1 | < 4 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 3-13d.0 | < 4 | Urographie: Intravenös |
| 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 3-13x | < 4 | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren |
| 3-200 | < 4 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-225 | < 4 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-582.1 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral |
| 5-585.0 | < 4 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-208.8 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 1-242 | < 4 | Audiometrie |
| 1-462.2 | < 4 | Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| 1-564.0 | < 4 | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis |
| 1-668.1 | < 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 3-825 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-560.1 | < 4 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Ballondilatation, transurethral |
| 5-561.2 | < 4 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Inzision, transurethral |
| 5-561.6 | < 4 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Ballondilatation, transurethral |
| 5-561.x | < 4 | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Sonstige |
| 5-562.3 | < 4 | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Einlegen einer Verweilschlinge |
| 5-570.4 | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 5-570.x | < 4 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige |
| 5-579.42 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral |
| 5-581.0 | < 4 | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision |
| 5-601.0 | < 4 | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion |
| 5-610.1 | < 4 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage |
| 5-612.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion |
| 5-621 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens |
| 5-622.0 | < 4 | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie |
| 5-622.5 | < 4 | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges) |
| 5-624.5 | < 4 | Orchidopexie: Skrotal |
| 5-629.x | < 4 | Andere Operationen am Hoden: Sonstige |
| 5-631.1 | < 4 | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele |
| 5-631.2 | < 4 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-634.2 | < 4 | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion |
| 5-637.1 | < 4 | Rekonstruktion von Ductus deferens und Epididymis: Vasovasostomie |
| 5-892.0c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 8-110.1 | < 4 | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter |
| 8-137.01 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal |
| 8-139.00 | < 4 | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung |
| 8-800.c0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-932 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarterien-druckes |
| 9-200.01 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angeborene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| AM15 | Belegarztpraxis am Krankenhaus | Urologische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von tubulointerstitiellen Nierenkrankheiten (VU01) ◦ Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz (VU02) ◦ Diagnostik und Therapie von Urolithiasis (VU03) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters (VU04) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems (VU05) ◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane (VU06) ◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems (VU07) ◦ Minimalinvasive endoskopische Operationen (VU12) | |

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-640.2 | 20 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-6.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Anzahl Personen | 4 | |
| Fälle je VK/Person | 120,50000 | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 3,77 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,77 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,07 | |
| Stationäre Versorgung | 3,70 | |
| Fälle je VK/Person | 130,27027 | |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,08 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,08 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,01 | |
| Stationäre Versorgung | 0,07 | |
| Fälle je VK/Person | 6885,71428 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,24 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,24 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,03 | |
| Stationäre Versorgung | 0,21 | |
| Fälle je VK/Person | 2295,23809 | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| PQ06 | Master | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

B-7.1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| | |
|--|-------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| Fachabteilungsschlüssel | 2600 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Zugänge

| Straße | PLZ / Ort | Internet |
|---------------|---------------|---|
| Enser Str. 19 | 34497 Korbach | http://www.krankenhaus-korbach.de/fachabteilungen/hno-belegabteilung/ |

Chefärztinnen/-ärzte:

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|--------------------------|---|--------------|-----|-----------------------------|
| Dr. med. Klaus Filipponi | Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 05631 / 3008 | | info@krankenhaus-korbach.de |
| Dr. med. Guido Hoffmann | Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 05631 / 3008 | | info@krankenhaus-korbach.de |
| Kurt Bodien | Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde | 05631 / 3008 | | info@krankenhaus-korbach.de |

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| | |
|---|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V: | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung: | |

B-7.3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres | |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres | |
| VH04 | Mittelohrchirurgie | |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres | |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen | |
| VH12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege | |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie | |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen | |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea | |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich | |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren | |
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge | |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich | |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren | |

B-7.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-7.5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 818 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-7.6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J34.2 | 156 | Nasenseptumdeviation |
| J35.0 | 98 | Chronische Tonsillitis |
| H81.2 | 97 | Neuropathia vestibularis |
| J32.4 | 87 | Chronische Pansinusitis |
| J35.1 | 36 | Hyperplasie der Gaumenmandeln |
| J35.2 | 34 | Hyperplasie der Rachenmandel |
| C44.3 | 32 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| J38.1 | 23 | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes |
| H91.2 | 20 | Idiopathischer Hörsturz |
| C44.2 | 19 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| J36 | 16 | Peritonsillarabszess |
| T81.0 | 13 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| R04.0 | 11 | Epistaxis |
| L57.0 | 10 | Aktinische Keratose |
| Q17.5 | 10 | Abstehendes Ohr |
| J38.3 | 8 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen |
| H72.0 | 7 | Zentrale Perforation des Trommelfells |
| J34.3 | 7 | Hypertrophie der Nasenmuscheln |
| J32.2 | 6 | Chronische Sinusitis ethmoidalis |
| J04.0 | 5 | Akute Laryngitis |
| S02.2 | 5 | Nasenbeinfraktur |
| C44.4 | 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| G51.0 | 4 | Fazialisparese |
| H66.1 | 4 | Chronische mesotympanale eitrige Otitis media |
| J38.7 | 4 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| L72.0 | 4 | Epidermalzyste |
| C32.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Glottis |
| J03.8 | < 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J38.4 | < 4 | Larynxödem |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K11.2 | < 4 | Sialadenitis |
| K12.2 | < 4 | Phlegmone und Abszess des Mundes |
| L57.8 | < 4 | Sonstige Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| C43.3 | < 4 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D10.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zunge |
| D10.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes |
| D22.3 | < 4 | Melanozytennävus sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| D36.7 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| G47.3 | < 4 | Schlafapnoe |
| H81.8 | < 4 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| J01.1 | < 4 | Akute Sinusitis frontalis |
| J01.4 | < 4 | Akute Pansinusitis |
| J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| J37.0 | < 4 | Chronische Laryngitis |
| J39.2 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| Q18.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses |
| B27.8 | < 4 | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| C00.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| C05.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C12 | < 4 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis |
| C43.4 | < 4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| D03.2 | < 4 | Melanoma in situ des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| D04.4 | < 4 | Carcinoma in situ: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| D10.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Lippe |
| D10.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Nasopharynx |
| D17.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D18.0 | < 4 | Hämangiom |
| D21.0 | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D48.5 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Haut |
| E04.1 | < 4 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F45.8 | < 4 | Sonstige somatoforme Störungen |
| H60.4 | < 4 | Cholesteatom im äußeren Ohr |
| H60.8 | < 4 | Sonstige Otitis externa |
| H61.0 | < 4 | Perichondritis des äußeren Ohres |
| H61.1 | < 4 | Nichtinfektiöse Krankheiten der Ohrmuschel |
| H65.4 | < 4 | Sonstige chronische nichteitrige Otitis media |
| H66.9 | < 4 | Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| H81.9 | < 4 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| I20.0 | < 4 | Instabile Angina pectoris |
| I50.1 | < 4 | Linksherzinsuffizienz |
| I89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J34.0 | < 4 | Abszess, Furunkel und Karbunkel der Nase |
| J34.1 | < 4 | Zyste oder Mukozele der Nase und der Nasennebenhöhle |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J35.8 | < 4 | Sonstige chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel |
| J38.2 | < 4 | Stimm lippenknötchen |
| J39.1 | < 4 | Sonstiger Abszess des Rachenraumes |
| J95.0 | < 4 | Funktionsstörung eines Tracheostomas |
| K09.8 | < 4 | Sonstige Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| K11.5 | < 4 | Sialolithiasis |
| K13.0 | < 4 | Krankheiten der Lippen |
| K13.7 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut |
| K14.0 | < 4 | Glossitis |
| L73.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haarfollikel |
| L82 | < 4 | Seborrhoische Keratose |
| L85.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Epidermisverdickungen |
| Q18.0 | < 4 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste |
| R04.2 | < 4 | Hämoptoe |
| R07.3 | < 4 | Sonstige Brustschmerzen |
| R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| T78.3 | < 4 | Angioneurotisches Ödem |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-612 | 719 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 5-215.3 | 246 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| 5-214.70 | 228 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| 1-242 | 227 | Audiometrie |
| 1-208.8 | 133 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 1-610.0 | 126 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 5-224.63 | 100 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) |
| 5-282.x | 64 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Sonstige |
| 5-281.x | 63 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Sonstige |
| 8-561.1 | 58 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 5-285.0 | 56 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 5-300.2 | 47 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch |
| 5-200.5 | 46 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-895.44 | 38 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Sonstige Teile Kopf |
| 1-630.1 | 30 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-902.24 | 25 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 1-620.10 | 22 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 3-820 | 16 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-214.6 | 16 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| 8-930 | 16 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-221.1 | 15 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| 5-200.4 | 14 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-895.14 | 13 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 5-906.04 | 12 | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Sonstige Teile Kopf |
| 5-184.2 | 10 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen |
| 5-188.0 | 10 | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Reduktionsplastik (z.B. bei Makrotie) |
| 5-195.90 | 9 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Ohne Implantation einer Prothese |
| 8-500 | 9 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 5-181.1 | 8 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-212.1 | 7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 1-620.1x | 6 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 5-210.1 | 5 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-216.1 | 5 | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal |
| 5-218.12 | 5 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit allogenen oder xenogenen Transplantaten |
| 5-285.1 | 5 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie |
| 5-289.1 | 5 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie |
| 5-903.14 | 5 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-215.1 | 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden |
| 5-222.0 | 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Infundibulotomie |
| 5-281.0 | 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 1-610.2 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie |
| 5-221.6 | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal |
| 5-281.4 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Rest-Tonsillektomie |
| 5-403.01 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 2 Regionen |
| 5-894.10 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Lippe |
| 5-894.14 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 1-207.0 | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 3-222 | < 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 5-065.1 | < 4 | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines |
| 5-181.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel |
| 5-185.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangsstenose) |
| 5-194.2 | < 4 | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Aufrichtung des Trommelfells (bei frischer Verletzung) |
| 5-213.1 | < 4 | Resektion der Nase: Partiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-215.4 | < 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-250.2 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision |
| 5-262.41 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis |
| 5-272.1 | < 4 | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, partiell |
| 5-403.00 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region |
| 5-895.25 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-902.04 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-208.2 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 1-421.0 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Supraglottis |
| 1-421.2 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Subglottis |
| 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-611.0 | < 4 | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt |
| 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-912 | < 4 | Neurophysiologische apparative Testverfahren zur Schmerzdiagnostik |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-225 | < 4 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-600 | < 4 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-802 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-82x | < 4 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel |
| 5-181.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung |
| 5-181.9 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision und/oder Destruktion am knöchernen äußeren Gehörgang |
| 5-182.1 | < 4 | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-188.3 | < 4 | Andere Rekonstruktion des äußeren Ohres: Plastik des Ohrläppchens |
| 5-195.b1 | < 4 | Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Antrotomie oder Mastoidektomie: Mit Implantation einer autogenen Prothese (z.B. Auto-Ossikel) |
| 5-204.3 | < 4 | Rekonstruktion des Mittelohres: Erweiterungsplastik des Gehörgangs oder Radikalhöhleneingangs |
| 5-210.0 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-212.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal |
| 5-214.7x | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Sonstige |
| 5-218.10 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| 5-218.20 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| 5-222.21 | < 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis |
| 5-230.0 | < 4 | Zahnextraktion: Einwurzeliger Zahn |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-250.x | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Sonstige |
| 5-262.01 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Mit intraoperativem Fazialismonitoring |
| 5-262.40 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis |
| 5-272.0 | < 4 | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal |
| 5-273.8 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, partiell, Lippe |
| 5-275.8 | < 4 | Palatoplastik: Velopharyngoplastik |
| 5-275.9 | < 4 | Palatoplastik: Primäre Segelplastik |
| 5-280.0 | < 4 | Transorale Inzision und Drainage eines pharyngealen oder parapharyngealen Abszesses: (Peri)tonsillär |
| 5-282.0 | < 4 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 5-289.4 | < 4 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-294.4 | < 4 | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik |
| 5-316.2 | < 4 | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostoma |
| 5-401.01 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Mit Radionuklidmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-429.8 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 5-894.09 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand |
| 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-895.24 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-895.30 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe |
| 5-895.55 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals |
| 5-903.x4 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| 5-915.44 | < 4 | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Elektrokaustik, großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-91a.xa | < 4 | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-932 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarterien-druckes |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres (VH01) ◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres (VH03) ◦ Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07) ◦ Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege (VH08) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen (VH10) ◦ Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege (VH12) | |
| AM15 | Belegarztpraxis am Krankenhaus | | | |

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-200.5 | 12 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-285.0 | 11 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 5-200.4 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| 5-285.1 | < 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie |
| 5-903.14 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig; Sonstige Teile Kopf |

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

trifft nicht zu / entfällt

B-7.11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Anzahl Personen | 3 | |
| Fälle je VK/Person | 272,66666 | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|-----------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 8,15 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,15 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,05 | |
| Stationäre Versorgung | 8,10 | |
| Fälle je VK/Person | 100,98765 | |

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,16 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,16 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,02 | |
| Stationäre Versorgung | 0,14 | |
| Fälle je VK/Person | 5842,85714 | |

Medizinische Fachangestellte

| | | |
|---|------------|--|
| Anzahl Vollkräfte | 0,51 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,51 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Ambulante Versorgung | 0,02 | |
| Stationäre Versorgung | 0,49 | |
| Fälle je VK/Person | 1669,38775 | |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ05 | Leitung von Stationen oder Funktionseinheiten | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Teil C - Qualitätssicherung

C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

| Leistungsbereich | Fallzahl | Dokumentationsrate in % | Kommentar / Erläuterung |
|--|----------|-------------------------|--|
| Ambulant erworbene Pneumonie | 392 | 99,5 | |
| Geburtshilfe | 318 | 99,4 | |
| Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) | 170 | 98,8 | |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 10 | 100,0 | |
| Herzschrittmacher-Implantation | 43 | 95,3 | |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 11 | 100,0 | |
| Hüftendoprothesenversorgung | 101 | 98,0 | |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 45 | 97,8 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel | 5 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation | 15 | 100,0 | |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | | | |
| Karotis-Revaskularisation | 4 | 75,0 | |
| Knieendoprothesenversorgung | 58 | 93,1 | |
| Leberlebendspende | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Mammachirurgie | 22 | 95,5 | |
| Neonatologie | | | |
| Nierenlebendspende | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation | 0 | | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Pflege: Dekubitusprophylaxe | 134 | 98,5 | |

C-1.2 Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren der QSKH-RL für: Auswertungseinheit

| Qualitätsindikator | Messung des Sauerstoffgehalts im Blut bei Lungenentzündung innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 2005 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,43 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,39 / 98,48 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 390 / 390 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 99,02 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Messung des Sauerstoffgehalts im Blut bei Lungenentzündung innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (Patientin/Patient wurde nicht aus anderem Krankenhaus aufgenommen) |
| Kennzahl-ID | 2006 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,50 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,45 / 98,54 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 386 / 386 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 99,01 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Messung des Sauerstoffgehalts im Blut bei Lungenentzündung innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (Patientin/Patient wurde aus anderem Krankenhaus aufgenommen) |
| Kennzahl-ID | 2007 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,63 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,25 / 96,97 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 4 / 4 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 51,01 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Behandlung der Lungenentzündung mit Antibiotika innerhalb von 8 Stunden nach Aufnahme (Patientin/Patient wurde nicht aus anderem Krankenhaus aufgenommen) |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 2009 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,27 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,18 / 95,35 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 366 / 362 |
| Rechnerisches Ergebnis | 98,91 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,22 / 99,57 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. In Lungenfachkliniken kann die ambulant begonnene antimikrobielle Therapie regelmäßig bei Aufnahme zur Erregerbestimmung abgesetzt werden. Dies kann zu rechnerischen Auffälligkeiten führen, muss jedoch nicht Ausdruck eines Qualitätsproblems sein. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Frühes Mobilisieren innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme von Patienten mit mittlerem Risiko, an der Lungenentzündung zu versterben |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 2013 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 94,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 93,88 / 94,13 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 226 / 221 |
| Rechnerisches Ergebnis | 97,79 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 94,93 / 99,05 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Feststellung des ausreichenden Gesundheitszustandes nach bestimmten Kriterien vor Entlassung |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 2028 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,59 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,49 / 95,68 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 263 / 262 |
| Rechnerisches Ergebnis | 99,62 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,88 / 99,93 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Messen der Anzahl der Atemzüge pro Minute des Patienten bei Aufnahme ins Krankenhaus |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50722 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,18 / 96,32 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 383 / 383 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 99,01 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50778 |
| Leistungsbereich | Außerhalb des Krankenhauses erworbene Lungenentzündung |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,04 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,58 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,03 / 1,05 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 390 / 48 / 47,79 |
| Rechnerisches Ergebnis | 1 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,77 / 1,30 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 1103 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,84 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,77 / 0,9 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | H20 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 54140 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,28 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,19 / 98,37 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 35 |
| Rechnerisches Ergebnis | 92,11 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 79,20 / 97,28 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/. Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). In Einzelfällen kann es zu begründeten Abweichungen von den Leitlinien kommen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem, das in der Mehrzahl der Fälle implantiert werden sollte |
| Kennzahl-ID | 54141 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,41 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,27 / 96,54 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 35 |
| Rechnerisches Ergebnis | 92,11 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 79,20 / 97,28 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 1. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie in der Mehrzahl der Fälle die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 1. Wahl nicht in der Mehrzahl der Fälle implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für das Einsetzen eines Herzschrittmachers aufgrund eines verlangsamten Herzschlags |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 54139 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 92,75 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 92,56 / 92,93 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 33 |
| Rechnerisches Ergebnis | 86,84 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 72,67 / 94,25 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | D50 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/. Die Indikation zur Herzschrittmacher-Implantation wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). In Einzelfällen kann es zu begründeten Abweichungen von den Leitlinien kommen, wenn Herzschrittmacher z. B. im Rahmen von Studien bzw. bei Erprobung neuer Verfahren implantiert werden. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem, das in der Minderzahl der Fälle implantiert werden sollte |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 54142 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,17 / 0,24 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 9,18 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 2. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie in der Mehrzahl der Fälle nicht die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 2. Wahl in der Mehrzahl der Fälle implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Lageveränderung oder Funktionsstörung der Sonde |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52311 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,41 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 3,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,33 / 1,5 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 40 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 8,76 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle im Vergleich zum Bundesdurchschnitt |
| Kennzahl-ID | 51191 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 3,99 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,91 / 1,03 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 1,74 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,31 / 8,96 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Kontrolle und zur Messung eines ausreichenden Signalausfalls der Sonden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52305 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,68 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,61 / 95,76 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 158 / 158 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 97,63 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | verbessert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einer Herzschrittmacher-Implantation, sondern auch Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Herzschrittmachers betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Krankenhausebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geradts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Entscheidung für ein geeignetes Herzschrittmachersystem, das nur in individuellen Einzelfällen gewählt werden sollte |
| Kennzahl-ID | 54143 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,67 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 10,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,58 / 1,77 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 9,18 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Die Systemwahl bei Herzschrittmacher-Implantationen wird anhand der aktuellen Leitlinien zur Herzschrittmacher- und kardialen Resynchronisationstherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie bewertet (Brignole et al. 2013). Systeme 3. Wahl werden als solche bezeichnet, da sie nur in Einzelfällen die korrekte Systemwahl darstellen. Werden Systeme 3. Wahl jedoch sehr häufig implantiert, kann dies auf Probleme bei der Auswahl des adäquaten Systems hinweisen. Brignole, M; Auricchio, A; Baron-Esquivias, G; Bordachar, P; Boriani, G; Breithardt, O-A; et al. (2013): 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal 34(29): 2281-2329. DOI: 10.1093/eurheartj/eh150. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beachten der Leitlinien bei der Auswahl eines Schockgebers |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50005 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,22 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,98 / 96,45 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 14 / 14 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 78,47 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>In Einzelfällen kann es zu begründeten Abweichungen von den Leitlinien kommen, wenn Defibrillatoren z. B. im Rahmen von Studien bzw. bei Erprobung neuer Verfahren implantiert werden. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden:</p> <p>https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50017 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,68 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,58 / 0,79 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 14 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 21,53 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51186 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,08 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 5,98 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,93 / 1,25 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 14 / 0 / 0,21 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Kontrolle und zur Messung eines ausreichenden Signalausfalls der Sonden |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 52316 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,92 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,79 / 96,05 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 38 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 90,82 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einer Defibrillator-Implantation, sondern auch Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Defibrillators betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Krankenhausebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Lageveränderung oder Funktionsstörung der Sonde |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52325 |
| Leistungsbereich | Erstmaliges Einsetzen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,69 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 3,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,6 / 0,81 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 14 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 21,53 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Vorbeugende Gabe von Antibiotika bei Kaiserschnittgeburten |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 50045 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | ja |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 99,03 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,99 / 99,07 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 87 / 87 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 95,77 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Übersäuerung des Blutes bei Frühgeborenen (Eingelungen) – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51831 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 5,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,9 / 1,13 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 4 / 0 / 0,01 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Kaiserschnittgeburten - unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52249 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,99 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,25 (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 / 0,99 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 314 / 86 / 84,29 |
| Rechnerisches Ergebnis | 1,02 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,85 / 1,21 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Schwergradiger Dammriss bei Spontangeburt – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51181 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,02 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 / 1,04 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 0,94 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,32 / 2,70 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückzuführen sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Übersäuerung des Blutes bei Neugeborenen (Einglingen) – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51397 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,05 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 / 1,1 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 308 / 0 / 0,58 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. Bei dieser Kennzahl handelt es sich um eine risikoadjustierte Kennzahl. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Kennzahlresultat systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieser Kennzahl sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel der Kennzahl nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zusammengefasste Bewertung der Qualität der Versorgung Neugeborener in kritischem Zustand |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 51803 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,32 |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,94 / 0,99 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 0,94 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,26 / 3,40 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | In diesem Qualitätsindex werden wesentliche Ergebnisparameter kombiniert, um den Zustand des Kindes einzuschätzen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Anwesenheit einer Kinderärztin / eines Kinderarztes bei Frühgeburten |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 318 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,97 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,76 / 97,17 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Übersäuerung des Blutes bei Neugeborenen (Einglingen) |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 321 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,21 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,2 / 0,23 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 308 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 1,23 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Diese Kennzahl ist kein Qualitätsindikator, da kein Referenzbereich definiert ist. Sie wird aus technischen Gründen im Jahr 2017 dennoch als Indikator dargestellt und ausgewertet. Aufgrund des nicht definierten Referenzbereichs wurde kein Strukturierter Dialog und somit keine Bewertung der Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Kennzahlresultat unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Gabe von Kortison bei drohender Frühgeburt (bei mindestens 2 Tagen Krankenhausaufenthalt vor Entbindung) |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 330 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 97,18 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,79 / 97,52 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zeitraum zwischen Entschluss zum Notfallkaiserschnitt und Geburt des Kindes über 20 Minuten |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 1058 |
| Leistungsbereich | Geburtshilfe |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,27 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,19 / 0,39 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 4 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 48,99 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Keine Entfernung des Eierstocks bei jüngeren Patientinnen mit gutartigem Befund nach Gewebeuntersuchung |
| Kennzahl-ID | 612 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 87,66 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 72,82 % (5. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 87,34 / 87,98 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 41 / 33 |
| Rechnerisches Ergebnis | 80,49 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 65,99 / 89,77 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 10211 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 8,94 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 20,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 8,5 / 9,4 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 16 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 19,36 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|--|--|
| Qualitätsindikator | Verletzung der umliegenden Organe während einer gynäkologischen Operation mittels Schlüssellochchirurgie – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51906 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,02 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 4,18 |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,95 / 1,09 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 158 / 0 / 1,25 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 3,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Verletzung der umliegenden Organe während einer gynäkologischen Operation mittels Schlüssellochchirurgie – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51906 |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Blasenkatheter länger als 24 Stunden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52283 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 2,77 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 5,59 % (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,67 / 2,87 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 110 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 3,37 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Fehlende Gewebeuntersuchung nach Operation an den Eierstöcken |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 12874 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,19 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 5,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,09 / 1,31 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 27 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 12,46 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Entfernung der Eierstöcke oder der Eileiter ohne krankhaften Befund nach Gewebeuntersuchung bei Patientinnen bis zu einem Alter von 45 Jahren |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52535 |
| Leistungsbereich | Gynäkologische Operationen (ohne Operationen zur Entfernung der Gebärmutter) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 19,38 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 15,45 / 24,03 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen im Zusammenhang mit einer Hüftgelenkerhaltenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54029 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,15 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 4,37 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,07 / 1,24 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 44 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 8,03 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Wartezeit im Krankenhaus vor der hüftgelenkerhaltenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet |
| Kennzahl-ID | 54030 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 16,23 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 15,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 15,94 / 16,53 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 44 / 5 |
| Rechnerisches Ergebnis | 11,36 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 4,95 / 23,98 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Patienten, die bei der Entlassung keine 50 Meter laufen können – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 54033 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,08 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 2,35 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,06 / 1,11 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 26 / 8 / 5,93 |
| Rechnerisches Ergebnis | 1,35 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,72 / 2,19 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Lageveränderung der Metallteile, Verschiebung der Knochenteile oder erneuter Bruch des Oberschenkelknochens – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 54036 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,96 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 4,92 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,87 / 1,06 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 44 / 0 / 0,28 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienten-eigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Nachblutungen oder Blutansammlungen im Operationsgebiet nach der hüftgelenkerhaltenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 54040 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,73 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 3,54 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,66 / 0,79 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 44 / 0 / 0,48 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthaltes – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54046 |
| Leistungsbereich | Hüftgelenkerhaltende Versorgung eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,02 (90. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,97 / 1,04 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 1,56 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,54 / 4,17 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Rate an Patientinnen mit einem positiven HER2-Befund |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 52268 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 13,15 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 12,89 / 13,41 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N02 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Für diesen Indikator wurde kein Referenzbereich definiert, sodass kein Strukturierter Dialog durchgeführt und somit keine Bewertung der Krankenhäuser vorgenommen wurde. Hintergrund ist, dass derzeit keine Kenntnisse eines validen Referenzbereichs für Deutschland vorliegen. Darüber hinaus kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass Verständnisprobleme bezüglich des Dokumentationsbogens zu Dokumentationsfehlern geführt haben könnten. Für das Erfassungsjahr 2017 wurde der Bogen angepasst. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung der Gewebeprobe während der Operation bei Patientinnen und Patienten mit markiertem Operationsgebiet (Drahtmarkierung) |
| Kennzahl-ID | 52279 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,24 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,99 / 96,47 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Röntgen- oder Ultraschalluntersuchung der Gewebeprobe während der Operation bei Patientinnen und Patienten mit markiertem Operationsgebiet (Drahtmarkierung) |
| Kennzahl-ID | 52330 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 99,23 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 99,1 / 99,35 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Lymphknotenentfernung bei Brustkrebs im Frühstadium |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 2163 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,06 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,02 / 0,16 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Qualitätsindikator. Die Ergebnisse zu diesem Indikator werden an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden, an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weitergeleitet. Nähere Informationen zu den planungsrelevanten Qualitätsindikatoren sind unter folgendem Link zu finden: https://www.iqtig.org/qs-instrumente/planungsrelevante-qualitaetsindikatoren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zeitlicher Abstand zwischen der Diagnosestellung und der erforderlichen Operation beträgt unter 7 Tage |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 51370 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 5,18 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 18,44 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 5 / 5,36 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Werden Operationen häufig innerhalb der ersten 7 Tage nach der Diagnose durchgeführt, kann dies auf Defizite bei der Information, Aufklärung und Einbeziehung von Patientinnen und Patienten in notwendige Entscheidungen hindeuten. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Absicherung der Diagnose vor der Behandlung mittels Gewebeuntersuchung |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 51846 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 97,16 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,04 / 97,28 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 17 / 17 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 81,57 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für eine Entfernung der Wächterlymphknoten |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 51847 |
| Leistungsbereich | Operation an der Brust |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,05 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,83 / 96,25 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 10 / 10 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 72,25 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für das geplante, erstmalige Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54001 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 96,65 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 96,56 / 96,73 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 34 |
| Rechnerisches Ergebnis | 89,47 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 75,87 / 95,83 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | H20 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für den Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54002 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 92,87 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 86,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 92,56 / 93,17 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 5 / 4 |
| Rechnerisches Ergebnis | 80 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 37,55 / 96,38 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | H20 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Wartezeit im Krankenhaus vor der Hüftgelenkersetzenden Operation, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet |
| Kennzahl-ID | 54003 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 15,63 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 15,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 15,34 / 15,93 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 54 / 8 |
| Rechnerisches Ergebnis | 14,81 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 7,70 / 26,60 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Vorbeugende Maßnahmen, um einen Sturz des Patienten nach der Operation zu vermeiden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54004 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 80,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 94,9 / 95,1 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 89 / 87 |
| Rechnerisches Ergebnis | 97,75 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 92,17 / 99,38 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beweglichkeit des Gelenks nach einem geplanten Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54010 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,95 / 98,08 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 34 |
| Rechnerisches Ergebnis | 89,47 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 75,87 / 95,83 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | U33 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Patienten, die bei der Entlassung keine 50 Meter laufen können – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 54012 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,33 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,99 / 1,03 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 68 / 6 / 4,67 |
| Rechnerisches Ergebnis | 1,29 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,60 / 2,61 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Todesfälle während des Krankenhausaufenthaltes bei Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu sterben |
|--|---|
| Kennzahl-ID | 54013 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,18 / 0,22 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 52 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 6,88 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |

| Qualitätsindikator | Todesfälle während des Krankenhausaufenthaltes bei Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu sterben |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54013 |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Aus den Bundesdaten konnten Risikofaktoren von Patienten ermittelt werden, die ihr Risiko, während des stationären Aufenthalts zu versterben, maßgeblich beeinflussen. Darauf konnten dann in einem zweiten Schritt die 10 % der Patientinnen und Patienten ermittelt werden, bei denen dieses Risiko besonders gering ist. Diese bilden die Grundgesamtheit für diesen Qualitätsindikator als die 10 % Patientinnen und Patienten mit „geringer Sterbewahrscheinlichkeit“. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Allgemeine Komplikationen im Zusammenhang mit dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks, das infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet |
| Kennzahl-ID | 54015 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 11,11 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 24,30 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 10,85 / 11,37 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 52 / 10 |
| Rechnerisches Ergebnis | 19,23 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 10,80 / 31,90 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Allgemeine Komplikationen, die mit dem geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks in Zusammenhang stehen |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54016 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,62 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 6,03 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,56 / 1,68 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 9,18 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Allgemeine Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile auftreten |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54017 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 6,21 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 17,46 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 5,93 / 6,51 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | H20 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen im Zusammenhang mit dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks, das infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfindet |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54018 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 4,52 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 11,11 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,35 / 4,69 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 54 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 6,64 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen, die mit dem geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks in Zusammenhang stehen |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54019 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 2,41 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 7,42 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,34 / 2,48 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 38 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 9,18 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile auftreten |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54120 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Hüftgelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 11,77 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 29,42 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 11,39 / 12,15 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für den Wechsel des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54022 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 90,88 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 86,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 90,47 / 91,28 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 6 / 6 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 60,97 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des künstlichen Kniegelenks oder einzelner Teile auftreten |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54125 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 5,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 14,70 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,71 / 5,33 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 6 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 39,03 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Todesfälle während des Krankenhausaufenthaltes bei Patientinnen und Patienten mit geringer Wahrscheinlichkeit zu sterben |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54127 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,04 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,03 / 0,05 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 46 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 7,71 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Beweglichkeit des Gelenks nach einem geplanten Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54026 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 92,42 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 80,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 92,29 / 92,54 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 46 / 35 |
| Rechnerisches Ergebnis | 76,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 62,06 / 86,09 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | U33 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Patienten, die bei Entlassung keine 50 Meter laufen können – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 54028 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,94 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 4,22 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,88 / 1 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 50 / 0 / 0,35 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Spezifische Komplikationen beim geplanten, erstmaligen Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54124 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,09 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 4,00 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,04 / 1,14 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für das geplante, erstmalige Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54020 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 97,64 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,56 / 97,72 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 46 / 35 |
| Rechnerisches Ergebnis | 76,09 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 62,06 / 86,09 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | D50 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für einen künstlichen Teiler-satz des Kniegelenks |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 54021 |
| Leistungsbereich | Operativer Einsatz oder Wechsel eines künstlichen Kniegelenks oder dessen Teile |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 95,93 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 90,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 95,65 / 96,2 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 1089 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,70 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,57 / 0,87 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 11 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 25,88 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 51404 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,00 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 5,63 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,86 / 1,15 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 11 / 0 / 0,1 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Sonden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52315 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Herzschrittmachers |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,78 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 3,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,6 / 1 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 9 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 29,92 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Technische Probleme mit dem Herzschrittmacher als angebrachter Grund für eine erneute Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52328 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 3,78 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 10,07 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 3,59 / 3,98 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 19 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 16,82 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50041 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 1,04 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,84 / 1,27 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Infektion als angebrachter Grund für eine erneute Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52002 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | ja |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,62 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,38 % (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,55 / 0,71 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 19 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 16,82 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Sonden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52324 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,58 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 3,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,42 / 0,8 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 51196 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 0,89 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ← 4,10 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,75 / 1,04 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/ . |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Eingriff steht, als angebrachter Grund für eine erneute Operation |
| Kennzahl-ID | 52001 |
| Leistungsbereich | Reparatur, Wechsel oder Entfernen eines Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 3,16 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 6,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 2,99 / 3,35 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|---|
| Qualitätsindikator | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts eine erhebliche Schädigung der Haut durch Druck erworben haben, die bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke reicht (Grad/Kategorie 4) |
| Kennzahl-ID | 52010 |
| Leistungsbereich | Vorbeugung eines Druckgeschwürs |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,01 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,01 / 0,01 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | A42 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | verschlechtert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | Trotz mehrfacher Aufforderung hat die Klinik keine Stellungnahme zum Sentinel Event abgegeben. |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 51398 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,25 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,18 / 0,33 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 9 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 29,90 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Die Sterblichkeit während bzw. unmittelbar nach einem isolierten Aggregatwechsel hängt nicht nur von der korrekten Durchführung des Eingriffs und einem spezifischen Notfallmanagement ab. Ein Teil der Sterbefälle ist durch patientenbedingte Faktoren und unglückliche Zufälle verursacht. Daher sind die Ergebnisse des Strukturierten Dialogs für die Feststellung tatsächlicher Versorgungsmängel von zentraler Bedeutung. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Durchführung der Kontrolle und der Messung eines ausreichenden Signalausfalls der Sonden |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 52307 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 97,78 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 97,67 / 97,88 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 51 / 51 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 93,00 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einem Herzschrittmacher-Aggregatwechsel, sondern auch Fälle mit einer Herzschrittmacher-Implantation sowie Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Herzschrittmachers betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Krankenhausebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geradts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 1096 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Herzschrittmachers (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,10 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,06 / 0,16 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 9 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 29,90 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Sterblichkeit während des Krankenhausaufenthalts |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 50031 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,20 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,13 / 0,3 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 5 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 43,50 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Die Sterblichkeit während bzw. unmittelbar nach einem isolierten Aggregatwechsel hängt nicht nur von der korrekten Durchführung des Eingriffs und einem spezifischen Notfallmanagement ab. Ein Teil der Sterbefälle ist durch patientenbedingte Faktoren und unglückliche Zufälle verursacht. Daher sind die Ergebnisse des Strukturierten Dialogs für die Feststellung tatsächlicher Versorgungsmängel von zentraler Bedeutung. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Zusammengefasste Bewertung der Qualität zur Durchführung der Kontrolle und der Messung eines ausreichenden Signalausfalls der Sonden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 52321 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,39 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,29 / 98,49 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 24 / 24 |
| Rechnerisches Ergebnis | 100 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 86,20 / 100,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Bei dem vorliegenden Indikator handelt es sich um einen sogenannten Qualitätsindex. Dies bedeutet hier, dass pro Behandlungsfall mehrere Messungen bewertet werden und zudem nicht nur Fälle mit einem Aggregatwechsel des Defibrillators, sondern auch Fälle mit einer Defibrillator-Implantation sowie Fälle mit einer Revision, einem Systemwechsel oder einer Explantation des Defibrillators betrachtet werden. Ziel ist es, dadurch eine erhöhte Anzahl an Messungen zu betrachten und somit das Fallzahl-Prävalenz-Problem (Heller 2010) zu reduzieren. Bei geringen Fallzahlen auf Krankenhausebene besteht das Risiko, dass rechnerische Auffälligkeiten unsystematisch (zufällig) durch wenige Einzelfälle entstehen. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Heller, G (2010): Qualitätssicherung mit Routinedaten – Aktueller Stand und Weiterentwicklung. Kapitel 14. In: Klauber, J; Geraedts, M; Friedrich, J: Krankenhaus-Report 2010: Schwerpunkt: Krankenhausversorgung in der Krise? Stuttgart: Schattauer, 239-254. ISBN: 978-3794527267. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Komplikationen während oder aufgrund der Operation |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 50030 |
| Leistungsbereich | Wechsel des Schockgebers (sog. Defibrillator) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (ohne Eingriff an den Sonden) |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 0,10 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 1,00 % (Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 0,06 / 0,18 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | 5 / 0 |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 43,50 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Schlaganfall oder Tod während der Operation – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|--|--|
| Kennzahl-ID | 11704 |
| Leistungsbereich | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,10 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 2,90 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,02 / 1,19 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Schlaganfall oder Tod während der Operation – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
| Kennzahl-ID | 11704 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/. In diesem Indikator werden neben periprozeduralen Schlaganfällen nur Todesfälle erfasst, die während des stationären Aufenthalts auftreten. Todesfälle, die in einem Zusammenhang zum Eingriff stehen, können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei diesem Indikator zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für eine Operation bei einer um 50 % verengten Halsschlagader und Beschwerden |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 604 |
| Leistungsbereich | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 99,82 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 99,71 / 99,89 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Schwerer Schlaganfall oder Tod nach Operation – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|--|--|
| Kennzahl-ID | 11724 |
| Leistungsbereich | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | |
| Bundesergebnis | 1,17 |
| Referenzbereich (bundesweit) | ≤ 3,95 (95. Perzentil, Toleranzbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 1,06 / 1,29 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | 0 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | 0,00 / 0,00 |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |

| Qualitätsindikator | Schwerer Schlaganfall oder Tod nach Operation – unter Berücksichtigung der Schwere aller Krankheitsfälle |
|---|--|
| Kennzahl-ID | 11724 |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | <p>Bei diesem Indikator handelt es sich um einen risikoadjustierten Indikator. Eine Risikoadjustierung gleicht die unterschiedliche Zusammensetzung der Patientenkollektive verschiedener Einrichtungen aus. Dies führt zu einem faireren Vergleich, da es patientenbezogene Risikofaktoren gibt (wie zum Beispiel Begleiterkrankungen), die das Indikatorergebnis systematisch beeinflussen, ohne dass einer Einrichtung die Verantwortung für z. B. daraus folgende häufigere Komplikationen zugeschrieben werden kann. Beispielsweise kann so das Indikatorergebnis einer Einrichtung mit vielen Hochrisikofällen fairer mit dem Ergebnis einer Einrichtung mit vielen Niedrigrisikofällen statistisch verglichen werden. Die Risikofaktoren werden aus Patienteneigenschaften zusammengestellt, die im Rahmen der Qualitätsindikatorenentwicklung als risikorelevant eingestuft wurden und die praktikabel dokumentiert werden können. Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Die Ergebnisse dieses Qualitätsindikators sind aufgrund von Anpassungen der Rechenregel des Indikators nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Nähere Informationen zu den vorgenommenen Anpassungen können der Beschreibung der Qualitätsindikatoren unter folgendem Link entnommen werden: https://iqtig.org/qs-verfahren/. In diesem Indikator werden neben periprozeduralen Schlaganfällen nur Todesfälle erfasst, die während des stationären Aufenthalts auftreten. Todesfälle, die in einem Zusammenhang zum Eingriff stehen, können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei diesem Indikator zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen. Schwere Schlaganfälle werden hier definiert als ischämische Schlaganfälle, bei denen ? Gehen nur mit Hilfe möglich ist und/oder eine komplette Aphasie vorliegt, ? die Patientin / der Patient bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig ist oder ? der Schlaganfall einen tödlichen Ausgang hat.</p> |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| | |
|---|--|
| Qualitätsindikator | Schlaganfall oder Tod nach Operation bei einer um 60 % verengten Halsschlagader und Beschwerdefreiheit und gleichzeitiger Operation zur Überbrückung eines verengten Gefäßes |
| Kennzahl-ID | 52240 |
| Leistungsbereich | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 6,64 |
| Referenzbereich (bundesweit) | Sentinel-Event |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 4,19 / 10,38 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | N01 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | eingeschränkt/nicht vergleichbar |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. Zu beachten ist, dass dieses Indikatorergebnis unter Umständen nicht ausschließlich durch die jeweilige Einrichtung beeinflusst wird. So können z. B. die Erkrankungsschwere oder Begleiterkrankungen der Patientinnen und Patienten einen Einfluss auf das Ergebnis haben. In diesem Indikator werden neben periprozeduralen Schlaganfällen nur Todesfälle erfasst, die während des stationären Aufenthalts auftreten. Todesfälle, die in einem Zusammenhang zum Eingriff stehen, können jedoch auch nach Entlassung bzw. Verlegung der Patientin / des Patienten auftreten. Daher kann es bei diesem Indikator zu einer Unterschätzung der Anzahl aufgetretener Ereignisse kommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

| Qualitätsindikator | Angebrachter Grund für eine Operation bei einer um 60 % verengten Halsschlagader und Beschwerdefreiheit |
|---|---|
| Kennzahl-ID | 603 |
| Leistungsbereich | Wiederherstellung eines ausreichenden Blutflusses durch einen Eingriff an der Halsschlagader |
| Indikator mit Bezug zu Infektionen im Krankenhaus | nein |
| Einheit | % |
| Bundesergebnis | 98,96 |
| Referenzbereich (bundesweit) | >= 95,00 % (Zielbereich) |
| Vertrauensbereich (bundesweit) | 98,78 / 99,12 |
| Grundgesamtheit / Beobachtet / Erwartet (Fallzahl) | |
| Rechnerisches Ergebnis | |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus) | |
| Ergebnis im Berichtsjahr | R10 |
| Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Entwicklung Ergebnis zum vorherigen Berichtsjahr | unverändert |
| Fachlicher Hinweis IQTIG | Der Referenzbereich gibt an, in welchem Bereich die Ergebnisse eines Indikators als unauffällig bewertet werden. Eine Einrichtung mit einem Ergebnis außerhalb des Referenzbereichs ist zunächst rechnerisch auffällig, dies zieht üblicherweise eine Analyse im Strukturierten Dialog nach sich. Es ist zu beachten, dass ein Indikatorergebnis außerhalb des Referenzbereichs nicht gleichbedeutend ist mit einer mangelnden Qualität der Einrichtung. Die Abweichung kann auch auf eine fehlerhafte Dokumentation oder auf Einzelfälle zurückführbar sein, in denen beispielsweise gut begründet von medizinischen Standards abgewichen wurde. Die Bewertung der Qualität wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs mit den Einrichtungen vorgenommen. |
| Kommentar/Erläuterung der auf Bundes- bzw. Landesebene beauftragten Stellen | |
| Kommentar/Erläuterung des Krankenhauses | |

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|------------|---|------------|-------------------------|
| Hessen | Gynäkologische Operationen: Operationen des Uterus myomatosus, die nicht vom bundesweit verpflichtenden Leistungsbereich erfasst sind | Ja | ja |
| Hessen | Schlaganfall: Akutbehandlung | Ja | ja |

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

| DMP | Kommentar / Erläuterung |
|------------|--|
| Brustkrebs | Wir führen die operative und medikamentöse Therapie bei Patientinnen mit Krebserkrankungen der Brust als Kooperationskrankenhaus des Brustzentrums Regio durch. Im Klinikverbund finden regelmäßig mit den Mitgliedskrankenhäusern interdisziplinäre fachärztliche Fallbesprechungen in der Universitätsfrauenklinik Marburg statt. In diesem Rahmen wird für jede Patientin nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ein individuelles Therapieschema erstellt. |

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

| Leistungsbereich | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/Erläuterung |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50 | 50 | Kein Ausnahmetatbestand (MM05) | |

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| | |
|--|----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 37 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | 25 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 25 |

(*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe www.g-ba.de)